


曆八月上中旬以「葱青」採收而出售，普通種植後約五十天，就可以採收「葱青」，早期栽培時請多施過磷酸鈣，以促進發根為宜。

(四) 採收「葱青」後可以種植番茄馬娜露西，栽培時每十畝宜用氫氧化鈣四五公斤左右作為基肥消毒土壤為佳（施氫氧化鈣後經過三星期始可種植番茄）。

(五) 番茄馬娜露西可以在農曆七月下旬開始育苗，並在農曆八月中旬俟球葱採收後種植，種植後約六十至六十五天就可開始採收，採收期間約四十至五十天。（王進生）

**木耳使用荷爾蒙 尙有待試驗證明**



【問】：在木耳生長期中，發生如盒內之蟲類（蟻及另一種類似毛蟲）兩類繁殖力甚強，並均能影響木耳之發育現將左列問題煩請解答之。

(一) 此蟲可否噴曬農田用二十五% DDT？噴後約六天採木耳，該藥對木耳之發育，對吃木耳的人有無影響？或有其他藥品可用？

(二) 請問栽培木耳有何技術？對增進木耳發育有何方法？木耳在生長期中是否也要任何食物促進它，有人說濕快豐收荷爾蒙劑是否適當？（彰記縣竹塘鄉黃炳煙）

【答】：來信附寄木耳青蟲標本，在運送途中已經腐爛，看不清為何害蟲，驅除青蟲最好方法，是將木耳栽培現場及周圍環境打掃清潔，減少青蟲匿藏，施用農藥時，應先知道它是何種害蟲，而後選擇最有效之藥劑，才能達到防治目的。

(一) 栽培木耳的技術有①選擇天陰四陽及通風良好之場地。②採用木耳生長最適之潤葉樹栽培，如榕樹油桐桑及柳樹等。③購買政府審查合格菌種場之木耳菌種。④管理應注意溫度濕度之配合，陽光透射之程度及通風等。

(二) 促進木耳發育荷爾蒙是否有效，需要試驗證明始能大規模應用，目前有很多商人投機取巧，擴大宣傳，望勿信任。（胡開仁）

**臺農四號鳳梨 施肥方法相同**



【問】：(一) 對於臺農四號鳳梨未知可以施用尿素肥料嗎？

(二) 如若可能者施用淨尿素於株間；或參水施於鳳梨葉面。

(三) 或用其他什麼肥料可以施入。

(四) 第四號鳳梨期間，何時至何時可以施肥。以上請指示嘉義縣中埔劉建英。

【答】：鳳梨可以使用尿素肥料來栽培，其施肥法即尿素與磷肥，鉀肥混合後施於鳳梨株間為妥，臺農四號品種亦同樣。施肥時期在三、四月間施下較好。（吳啓東）

**包心白菜易生腐敗病 以避免連作為佳**



【問】：包心白菜繼續連作未知可否，連作管理方法並施肥方法病蟲害防治，希望指教。（彰化縣溪州鄉彭明地）

【答】：(一) 包心白菜容易發生腐敗病，一旦發生腐敗病其病菌殘留圃場而傳染後作之作物，故宜不連作為原則，雖與其他作物輪作，但宜不與葉菜類、葱、胡蘿蔔輪作，避免互相傳染腐敗病，致使無收成。最好與水稻，胡瓜菜豆等輪作為佳。

(二) 若必需要連作，圃場宜用一千倍烏斯普龍消毒液播種穴後下種，並在本葉展開後繼續噴射大生七八四〇〇至五〇〇〇倍。腐敗病菌不但由葉部侵入，並且由根部侵入。

**經濟部核定甲級農藥工廠**



各種乳劑 應有儘有

稻熱病  
三本 西樂生石灰

殺蟲劑  
三本 B.H.C. 1.5% 3% 粉劑

殺蟲劑  
三本 飛佈達粉劑  
可防治地下蟲害

增加產量請用 山本農藥



山本農藥有限公司

臺北市開封街一號18號  
電話：2 3 6 0 6

請全省獸醫師養豬養雞業者注意！

豬、雞驅蟲藥之王  
アスカリケン  
阿司卡利肯

(內藥登字第一四六四號)

「適應症」豬、雞之蛔蟲症、結節蟲症、鞭蟲症  
公認  
最安全  
最有效  
最便宜

①效力強大——殺蟲之力量百分之九十五以上。比任何種驅蟲藥超。成蟲、蟲卵均死滅絕無副作用。

②用法簡單——投藥前不須絕食，服後不須使用瀉藥洗腸。

③價格最廉——豬一頭一元，成雞一隻僅五分代價可獲得數百倍利益。

日本東芝製藥株式會社榮譽出品

臺灣總代理 臺灣獸醫儀器藥品股份有限公司

臺北市信義路二段一二〇號

