


，故新鮮的人糞尿，不可使用，避免損害根部減少病菌侵入之機會。肥料須注意三要素配合，宜增加磷酸鈣及鉀分，使它的生育健全，並注意園場之排水。品種宜採用平矮一號，較抗腐敗病。中耕除草，宜在生育初期行之，一旦開始結球，不可進入園場，因會損害葉一部，並腳會壓斷細根，增加病害發生之機會。

(三) 種子可用冷水及溫水消毒法來處理，將種子浸於清水六小時後，再浸於五十四度的溫水五分鐘，就可殺滅黑斑病菌。連作時病毒病發生亦多，故噴射大生時與加用馬拉松液除蟲。 (王進生)

橫貫公路沿線

適合栽植雪梨



【答】：(一) 日本長十郎雪梨(有名雪梨，正花梨)合於本省栽培否，海拔高度需要若干。

(二) 橫山水梨分有早生，中生，晚生未悉哪種較佳，及果粒大小如何。海拔高度如何。

(三) 橫山水梨嫁接木需要何種，何處有售，請指教。(宜蘭縣頭城鎮林棟樑)


【答】：(一) 日本種梨，長十郎，適宜於本省北部，海拔一千公尺以上，中部一千三百公尺以上高冷地栽培。目前本省橫斷公路沿線之梨山，思源等地均有長十郎之栽培。梨山福壽山農場並有苗木之出產。

(二) 橫山水梨適於本省中、北部平地及丘陵地帶栽培，有早中晚生之三種，其中中生收量高，品質佳，為最普遍栽培之品種。早中晚生三種之果粒大小比較如下表：

品種名	重量	高	長徑	短徑
橫山早生梨	六六公分	六六公分	七公分	七公分
橫山中生梨	六六公分	六六公分	七公分	七公分
橫山晚生梨	六六公分	六六公分	七公分	七公分

(二) 橫山梨以鳥梨為砧木。售苗處可參照本刊廣告。(翁仁祿)

施用尿素 可混農藥



【問】：(一) 日製尿素，可否和農藥混合使用噴在包心白菜上。

(二) 尿素對包心白菜之葉面施肥之濃度若干。

(三) 噴射之時間何時最好在上午或下午。(高雄縣路竹鄉王元全)

【答】：尿素，無論日製或省製，均一樣可以和農藥混合使用，噴在白菜上，尿素之稀釋濃度二%為適宜，使用時間最好在上午，包心菜葉上沒有水滴時噴上。(吳啓東)

本省種植棗樹 中南部較相宜

【問】：(一) 適應栽培棗的地質和氣候怎樣？

(二) 棗是否有栽培經濟價值，銷路如何？

(三) 最近有種苗商出售大粒甜棗者，據稱經過改良，品質比較原來好，且果實較大豐產，是否事實？

(四) 據聞棗栽植後一年即可生產，是否事實，如果事實，是否可以和柑桔間作栽培，待柑桔樹成齡時砍除棗樹。(嘉義鄉鹿草鄉林明傳)

【答】：(一) 棗樹，在本省各地均可生長，惟印度為原產之故，本省中、南部一帶較適宜。樹勢旺盛，不擇土壤，稍酸性土壤仍可生長，地勢以排水良好，但不過於乾燥之地為佳。

(二) 棗果，現時因市場供給量少之故，銷路好，價格高(去年之批發價為每公斤四元至六元)。

(三) 近日來彰化縣永靖鄉新高苗圃出售之大果品種果型大，成量豐富，漿液，甘味略少，具蘋果味。

(四) 栽植一年後，雖可生產，但收量

大肥

抗生藥綜合維他命礦質補助飼料



飼料店，農會均售

促進產卵 預防疾病

益源製藥所 台北市羅斯福路三段二七二號



與德國拜耳藥廠及瑞士嘉基公司技術合作在臺獨家配製

五豐商標

富粒多乳劑 巴拉松乳劑 馬拉松乳劑 馬巴乳劑 安巴乳劑 大利農乳劑 安特靈乳劑 克羅苯乳劑 西樂生石灰 蟬螂螞蟻藥

經銷處

- ① 臺北市迪化街一段175號 臺灣農產企業公司 電話 44253
- ② 臺中市三民路229號 信全農藥行 電話 3343
- ③ 員林中山路229號 信全農藥行 電話 134
- ④ 雲林斗南鎮南昌里新興街30號 永豐農資材行 電話 174
- ⑤ 嘉義縣義竹鄉六柱村201號 農安藥房 電話 4971
- ⑥ 臺南市東門路140號 永豐藥行 電話 4971
- ⑦ 高雄縣鳳山鎮第二場市內 農友種子行 電話 4971
- ⑧ 高雄路竹鄉竹西村170號 福源商號 電話 4971
- ⑨ 宜蘭縣農會及各鄉鎮農會
- ⑩ 花蓮縣農會及各鄉鎮農會
- ⑪ 桃園縣農會及各鄉鎮農會
- ⑫ 新竹縣農會及各鄉鎮農會
- ⑬ 苗栗縣農會及各鄉鎮農會
- ⑭ 嘉義縣農會及各鄉鎮農會
- ⑮ 屏東縣農會及各鄉鎮農會
- ⑯ 高雄縣農會及各鄉鎮農會
- ⑰ 台南縣農會及各鄉鎮農會
- ⑱ 澎湖縣農會及各鄉鎮農會
- ⑲ 金門縣農會及各鄉鎮農會
- ⑳ 馬祖縣農會及各鄉鎮農會

五豐化學工業股份有限公司

公司：臺北市中正路1791號二樓 電話：31691
工廠：北基公路七堵草蓋站旁 電話：七堵36號