


，故新鮮的人糞尿，不可使用，避免損害根部減少病菌侵入之機會。肥料須注意三要素配合，宜增加磷酸鈣及鉀分，使它的生育健全，並注意圃場之排水。品種宜採用平塚一號，較抗腐敗病。中耕除草，宜在生育初期行之，一旦開始結球，不可進入圃場，因會損害葉一部，並腳會壓斷細根，增加病害發生之機會。

(三) 種子可用冷水及溫水消毒法來處理，將種子浸於清水六小時後，再浸於五十四度的溫水五分鐘，就可殺滅黑斑病菌。連作時毒素病發生亦多，故噴射大生時與加用馬拉松液驅除蚜蟲。(王進生)

橫貫公路沿線  
適合栽植雪梨



【答】：(一) 日本長十郎雪梨(有名雪梨，正花梨)合於本省栽培否，海拔高度需要若干。

(二) 橫山水梨分有早生，中生，晚生未悉那種較佳，及果粒大小如何。海拔高度如何。

(三) 橫山水梨嫁接木需要何種，何處有售，請指教。(宜蘭縣頭城鎮林棟樑)


【答】：(一) 日本種梨，長十郎，適宜於本省北部，海拔一千公尺以上，中部一千三百公尺以上高冷地栽培。目前本省橫斷公路沿線之梨山，思源等地均有長十郎之栽培。梨山福壽山農場並有苗木之出產。

(二) 橫山水梨適於本省中、北部平地及丘陵地帶栽培，有早中晚生之三種，其中中生收量高，品質佳，為最普遍栽培之品種。早中晚生三種之果粒大小比較如下表：

品種名	重量	高	長徑	短徑
橫山早生梨	六六公分	六公分	七公分	七公分
橫山中生梨	六六公分	六公分	七公分	七公分
橫山晚生梨	六六公分	六公分	七公分	七公分

(二) 橫山梨以鳥梨為砧木。售苗處可參閱本刊廣告。(翁仁敏)

施用尿素  
可混農藥



【問】：(一) 日製尿素，可否和農藥混合使用噴在包心白菜上。

(二) 尿素對包心白菜之葉面施肥之濃度若干。

(三) 噴射之時間何時最好在上午或下午。(高雄縣路竹鄉王元全)

【答】：尿素，無論日製或省製，均一樣可以和農藥混合使用，噴在白菜上，尿素之稀釋濃度二份為適宜，使用時間最好在上午，包心菜葉上沒有水滴時噴上。(吳啓東)

本省種植棗樹  
中南部較相宜

【問】：(一) 適應栽培棗的體質和氣候怎樣？

(二) 棗是否有栽培經濟價值，銷路如何？

(三) 最近有種苗商出售大粒甜棗者，據稱經過改良，品質比較原來好，且果實較大豐產，是否事實？

(四) 據聞棗栽植後一年即可生產，是否事實，如果事實，是否可以和柑桔間作栽培，待柑桔成齡時次除棗樹。(嘉義鄉鹿草鄉林明傳)

【答】：(一) 棗樹，在本省各地均可生長，惟印度為原產之故，本省中、南部一帶較適宜。樹勢旺盛，不擇土壤，稍酸性土壤仍可生長，地勢以排水良好，但不過於乾燥之地為佳。

(二) 棗果，現時因市場供給量少之故，銷路好，價格高(去年之批發價為每公斤四元至六元)。

(三) 近日來彰化縣永靖鄉新高苗圃出售之大棗品種果型大，成量豐富，漿液，甘味略少，具蘋果味。

(四) 栽植一年後，雖可生產，但收量

與德國拜耳藥廠  
及瑞士嘉基公司  
技術合作在臺獨家配製

五豐商標

富粒多乳劑	巴拉松乳劑	馬拉松乳劑	馬巴乳劑	安巴乳劑	大利農乳劑	安特靈乳劑	克羅芥乳劑	西樂生石灰	蟬螂螞蟻藥
-------	-------	-------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------

經銷處

① 臺北市 迪化街 臺灣農產企業公司	電話 44253
② 臺中市 三民路一段175號	信全農藥行 電話 3343
③ 員林市 中山路229號	信全農藥行 電話 134
④ 雲林斗南鎮 南昌里新興街30號	永豐農資材行 電話 174
⑤ 嘉義縣 義竹鄉六柱村201號	豐安藥房 電話 4971
⑥ 臺南市 東門路140號	永豐農資材行
⑦ 高雄縣 鳳山鎮第二場市內	農友種子行
⑧ 高雄縣 竹寮鄉西村170號	福源商號
⑨ 宜蘭縣 農會及各鄉鎮農會	及及各鄉鎮農會
⑩ 桃園縣 農會及各鄉鎮農會	及及各鄉鎮農會
⑪ 新竹縣 農會及各鄉鎮農會	及及各鄉鎮農會
⑫ 苗栗縣 農會及各鄉鎮農會	及及各鄉鎮農會

五豐化學工業股份有限公司

公司：臺北市中正路1791號二樓 電話：31691  
工廠：北基公路七堵草蓋站旁 電話：七堵36號

# 大肥啾

抗生藥綜合維他命礦質補助飼料

飼料店，農會均售

促進產卵 預防疾病

益源製藥所  
台北市羅斯福路三段二七二號