

，每穴播二至三粒種子，覆土，無須灌水。

「賜保根」拌種，或用一烏斯普龍一千倍液浸漬消毒一小時。

在水田裏作，每隔三

行稻株播一行，使行距在六七·五至七二公分左右；株距以二十四至三十公分為宜。可以採用不整地栽培。

播種穴宜用如右圖的工具開掘；深度約十至十二公分。掘好後以最迅速的方法施下基地，然後播種，以免損失水分。

施肥要遠離種子植株

豌豆不能和硫酸銨、尿素、氯化鉀等直接接觸，所以，以堆肥、過磷酸鈣、尿素、氯化銨等作為基肥時，須加一層間土後播種。

每十公畝地用量，腐熟堆肥一千公斤左右，過磷酸鈣三十五公斤，充分攪拌混合後施下。

追肥須看初期生長而定；為促進初期生長，宜施尿素十至十二公斤，過磷酸鈣十公斤，氯化鉀十至十二公斤，但須施在離開植株六公分的地方，不可以和根部直接接觸。

追肥也可用豬糞尿，但是不能用人糞尿。一般說來，每十公畝地的三要素施用量，氮素約七公斤，磷約十二公斤，鉀質十五公斤。


開掘排水溝排除雨水

在旱地栽培，乾燥期須酌行灌水。水田整地栽培，也應灌水。

但在水田裏作不整地栽培時，因土壤經常保持適當水分，雖在乾燥期也無須灌水；不過為排出下雨時之一時積水，須在田邊周圍開掘排水溝。

噴藥需要加用展着劑

加工用豌豆易受豆潛莖蠅為害，所以應在生育初期(在尚未開花以前)噴射「安特靈」一次。



加工用豌豆的播種

為預防炭疽病發生，除勵行種子消毒外，需在發芽後本葉展開時開始噴射「大生七八」四百倍液二至三次。

在開花結莢期，因通風不佳，容易發生白粉病，所以須噴射「可利生」一千至一千五百倍液。

蚜蟲和潛葉蟲宜噴射「馬拉松」八百倍液。種子斑點由夜盜蟲食害而發生，所以應噴射二五%D T乳劑五百倍液防治夜盜蟲。

銹病、褐紋病、褐斑病的防治方法和炭疽病相同。噴射藥劑時，須加用展着劑，俾使藥液粘着率提高。

開花後約二十天採收

為提高產品品質，加工用豌豆必須在適期採收。

在攝氏十八度左右時開花後，約經二十五至二十八天為採收適期。

在攝氏二十度左右時，應提早一星期，即約二十天後採收。

適期採收的豆粒呈濃綠，甜嫩而品質好。過熟的豆粒已硬化，品質、顏色都差。

依肉眼判斷，以豆莢已經飽滿，但顏色尚呈濃綠或綠色時，為採收的適期。採收應分數次舉行。

農業

廣播

消息

九月份下半月的花蓮區農業改良場農事作業指導(好農村廣播)節目，二十二日是「菸葉苗床期重要病蟲害如何防治」，二十九日是「如何鑑別牛隻的優劣(上)」。

英國福施芬 50 號

西德拜耳巴拉松 50%

英國植物保護有限公司出品 世界最權威農藥
耳廠出品最強力殺蟲劑，可殺除水稻二化、三化、螟蟲及果樹蔬菜等四百余种害蟲。

備用蕃薯機連猪菜機

雙踏式，也可裝用於馬達；耕耘機，同一臺可作數種工作勝過人工 30 倍省人工，時間節省柴草，堅固耐用，其他各種小型手搖簽機，備品充備

種子：秋冬季蔬菜種子，絲肥種子，噴霧器

圖樣說明書附郵八角函索即寄

順隆種子行

桃園縣新生路68號電話：133號
(中央戲院邊左轉彎)郵劃1916號

最新驚人的植物 荷尔蒙 劑已出現!!

純粹一植物生長綜合質 獨家劑一
高單位保證品質 一滴顯效

快豐收液劑

中央標準局註冊商標 第 12718 號
AUXIN-H61

快豐收之特點

- ①增加作物體之生長果着花之速度並促進成熟期
- ②防止花落果改良品質增加產量提早收成
- ③增加促芽率促進活著力
- ④抵抗病蟲害並防止稻熱病等發生
- ⑤增加產量二成至六成
- ⑥快豐收品質絕對與他貨大不相同

製造廠 神農化工廠出品
廠址 南投縣名間鄉濁水村39號