

裡作紅豆， 利益優厚！



周德雄

紅豆(小豆)原產我國東北，本省自民國六年，在高雄縣桃源鄉試種成功，才成爲山地的特產。
近兩年來，屏東縣的農友，將紅豆作爲第二期水田裡作栽培，每公頃產量達三十石左右，以市價每石八百元計算，就有二萬四千元的收入，利益遠勝任何作物。

紅豆在本省平地的栽培歷史很短，目前有關紅豆栽培管理的文獻也很少，一般有興趣種紅豆的農友，都沒有適當的資料做爲準繩，因此，筆者僅將近年研究和栽培經驗所得，略述如下以供農友們參考：

春秋兩季均可播種

紅豆在本省南部，春秋兩季均適於栽培，但以秋季栽培易於管理，種粒飽滿。春作適當的播種期爲二月中旬至三月上旬；秋作爲九月下旬至十月中旬。

整地或不整地栽培

紅豆對土壤的選擇並不太嚴格，除重粘土外，任何土壤都能栽培，但以表土深厚，富含有機質，而排水良好的砂質壤土和壤土較好。

紅豆栽培法，一般可分爲整地栽培和不整地栽培兩種。
如果前作物收穫後，要採用整地栽培，紅豆播種前，將土地犁翻一至二次，使土壤疏鬆，並且耙平，然後開播種溝播種。
屏東地區盛行不整地栽培法，可以節省成本，並且方法簡單易行，值得採用。預定栽培紅豆的第二期水田，應於收刈前一星期灌水，使土壤濕潤。水稻收穫後，立即把殘餘稻株齊地割除，並將堆肥、氮、磷、鉀肥料的全量當基肥施於田面，然後以稻行間隙五行爲一畦，播種四行，留一行做畦溝。播種時

親愛的農友們!! 蔬菜栽培期來臨了

您希望栽培蔬菜成功發財嗎?

請利用最誠實最信用最可靠
嘉清河精選優良種子
必定能使您獲得滿意之意外收益



- 新夏秋35天包心白菜子
 - 早中生35天黑葉包心白菜子
 - 中生70天白結晶花椰菜子
 - 中生晚大白結晶花椰菜子
 - 50天大白粒菜頭子
 - 南畔州原種株冬瓜白菜頭子
 - 60天短種菜頭子
 - 早中生黃心白骨芹菜子
 - 青皮白荊葫瓜子(目瓜)
 - 赤葉包心芥菜子
 - 白花軟莢荷蘭豆子
 - 蘇魯種矮性木瓜子
 - 松茸洋菇種菌(厚耳、白耳)
 - 想恩樹種子
 - 變性皇帝豆(福特好)
 - 白花尖葉格蘭菜子(食心用)
 - 青江白菜子
 - 日本長岡一號甘藍菜子
 - 日本黃葉サクセツヨン甘藍子
 - 日本長岡理想結球白菜子
 - 其它未刊載種子
- 對於各種詳細請參閱敝行一九六二年出版「新園藝」可週知至索付郵三元(工本費)即寄
附註敝行新園藝(目錄內)各項菜子價格依照行情(時價)起落加減計算

清河種子行

嘉義市中正路四八二號
電話：五五八四號
劃撥儲金嘉字八〇〇三七號

每一稻株間隙放種子二至三粒(用移植後挖小穴播種亦可)。放種完畢，第五行稻株間隙(即沒有播種預留為畦溝那一行)用蜈蚣犁來回耕耙，使土壤鬆軟，再用雙面犁把鬆土翻起，蓋在兩邊的畦面上，然後用鋤頭把溝底鬆土清一次，並將土壤均勻覆蓋畦面的紅豆種子。

紅豆植株不太高大，一般以行距一·二臺尺，株距五臺寸為適宜。

肥料用量必需充足

紅豆需要充分的肥料，方能增產。紅豆的根部雖能固定空中的氮氣，但仍須施用相當的氮肥，以促進初期的生育。

施肥量的多少，要看土地的肥瘠決定，普通土地一分地的肥料用量如下：

堆肥：一千臺斤 硫酸銨：三十臺斤
過磷酸鈣：五十臺斤 氯化鉀：十五臺斤

堆肥、磷肥、鉀肥的全量，和氮肥的半量做基肥，在整地播種時施用。另一半的氮肥，應於紅豆發芽後二星期施用。

點播·每穴播二三粒

播種溝開完後，採用點播，每穴播二至三粒種子。

播種深度視土質而定，砂土宜深，壤土較淺，普通為一臺寸左右。每分地需種子三至五臺斤。

除草·培土·間苗

紅豆種子發芽前，絕對不可灌水，以免種子腐爛，影響種子發芽。

幼苗出土後二星期，看雜草滋生情形，行中耕除草一至二次。中耕除草後就要培土，培土時將紅豆條間的土向植株間培土，高度一至二寸。


豆苗過密時，應於中耕除草時間苗，普通一穴留一至二株健全苗。

灌溉·排水·噴藥

紅豆生育期間，土壤需要保持適當濕潤，以利生長，所以必須適度灌溉。灌溉方法以條溝灌水，使水分慢慢滲透，不應全面積水。

紅豆生育期間，田間不可積水，以免根部腐爛。春作灌水過多或積水時，最易發生立枯病，常常全園枯死，所以應特別注意排水。

紅豆主要病害為立枯病，目前還沒有藥劑防治，栽培管理應避免豆園積水。蟲害主要為潛蠅類、螟蟲類，以及蚜蟲類，可參照大豆蟲害防治方法，在生育期間噴藥四次；但是在豆莢飽滿後應絕對禁止噴藥。



培栽地整不的豆紅

天下一品

農家之友元山公司

榮譽出品

元

子

素

豬藥霸王！

最新出品快肥素徵求各縣市鄉鎮經銷商，有意者請函告臺南郵政信箱一六九號元山公司