


的全年開花的花

天竺葵



彭昌祐

天竺葵又名洋繡球，是一種全年開花的花卉，花色很多，葉色常綠，最宜作室內或窗臺上的擺飾。

天竺葵(ゼラニウム)又名洋繡球，是一種常見的常綠性盆栽花卉。圓形草綠色的葉片終年不凋；花是由許多小花組成的球狀花，開花容易，花數亦多，顏色有朱紅、大紅、洋紅、粉紅、白色等。全年開花，而秋季至春季之間開得最多。最宜陳列于室內或窗臺上，也宜以露地種于花壇，植株生長越大，所開的花數越多，而且花朵也較大。

等切口乾了再扦插

天竺葵一般均為扦插繁殖。於秋季或冬季選擇幼嫩芽梢，長二三寸，自大株上用銳利

的小刀割下，削去莖部一寸以內的葉片，放一、二日，等切口已經乾燥時，再插入沙中或細土中，放在半陰地點，不時澆水，約三星期即可生出新根，長出新葉。因為天竺葵的枝條柔軟多汁，照一般的方法扦插，容易腐爛，所以要等傷口略為乾燥後，再行扦插。

生根後移盆栽

天竺葵扦插生根後，便可移到花盆中栽植，五寸口徑至八寸口徑的素燒盆，均可利用。盆土用壤土二份，堆肥一份，沙一份合成，在盆土中多加草木灰或稻殼灰，可使葉色

美麗，而葉片邊緣不致因缺鉀而變焦黃，有損美觀。

摘心可使花姿美觀

天竺葵生長至五、六寸高時，即可摘心。將中心的生長枝剪下扦插，促使自莖部發生新枝，全株成叢生狀態，則花枝數目可以增加，全株姿態也較美觀。若放任頂枝生長，下部葉片老化脫落後，露出光禿禿的枝幹，則花枝既少，外觀也很難看。

排水良好才不至腐爛

天竺葵生長期中需很多水分，但排水也要完全，否則因天竺葵枝葉多汁，容易腐爛。雨季時，盆栽的天竺葵需要搬入室內或廊下，露地栽培的要

改善排水情形，或掘起暫時移至室內，等雨季過後，再種回原處。本省各地栽植的天竺葵，在雨季中往往有重大的損失，所以其數量遠較其他的花卉為少，因為供不應求的關係，價錢也在其他花卉之上。

生長良好病蟲害也少

一般花卉，當根部充滿盆的內部，而且有細根自排水孔鑽出時，便要換入較大的盆。不然根部因擁擠而死亡，缺少吸收水分養分的新根，全株即陷入生育停頓的狀態中。但天竺葵却無此現象，儘管根部充滿盆內，生長仍舊良好，只須常常補充肥料，尤其是鉀肥，便可以四時繁茂。

廢物利用

用一塊一公分半厚的木板，削成刷子柄的形狀，然後在瓶蓋的中央，鑽一小孔，再用螺絲釘將瓶蓋裝在木板上，就成了一種刮鱗器(見圖)，用它來刮刺魚鱗，非刮刺魚鱗，非器



預測生產的日期

已婚婦女，在正常的月經期停止來潮時，那就應該想到，或可能是懷孕了。應該去婦產科醫生處檢查一下，是否確實懷孕。

懷孕後，你一定很想知道生產的大概日期。這是可以預先測得的。就是從最後一次月經算起，經過二百八十天，就是預產期了。所以只要記得自己最後一次月經來潮的日子，加上二百八十天就是了。

譬如說：孕前最後一次月經是一月一日，那末加上二百八十天，大約是十月八日左右。不過這是一個大概的日子，並不是絕對準確的，略早幾天或略遲幾天，都有可能，並沒有關係，但如過早或過遲，就須多加注意了。此外計算分娩時間還有一個簡單的計算公

月枝

式，就是把末次月經來潮時的日子，加上九個月或退後三個月，再加上七天就是生產的日子。譬如說末次月經是十一月二十日，加上九個月或退後三個月，就是第二年的八月，再加上七天，就是八月二十七日就是預產期。

得這個方式，那末當你懷孕後，就可測得生產的日期而有所準備，不致於臨時慌忙了。

