

李、桃、甜味楊桃

均不適高壓法繁殖



【問】：(一) 李、桃、及甜味楊桃等樹，是否可以使用空中壓條法繁殖。
(二) 如可用壓條法繁殖，應該何時施行，用法如何。

【答】：李、桃均不適高壓法繁殖。須用苦桃為砧木嫁接，楊桃亦以酸楊桃為砧木嫁接為佳，惟砧木不易得手時，亦可採用高壓法繁殖。

殖。

繁殖方法：在四、五月間，將二、三年生枝條，從先端一公尺附近之直徑二、四公分部份，行寬約三公分連木質部之環狀剝皮後，用泥土包復，然後再用塑膠紙包之。

(環狀剝皮後，將處理部份放置一、二個月後，再包復泥土亦可)，待發根後鋸斷，假植於苗圃。(翁仁祿)

要定購山柑種子

需在秋季以前

【問】：據說，嫁接柑桔(華倫夏)甜橙類砧木。以山柑(野生柑)為最好。因為產地無此類種子，所以煩請貴社給於答覆或是請轉問農業機關，試驗所有否及售價。(苗栗縣銅羅鄉賴進財)

【答】：(一) 晚寄西亞甜橙之砧木，仍以酸桔為最佳。山柑砧之晚寄西亞甜橙，雖耐病性較強，但爾後之生長不如酸桔砧者。

(二) 山柑種子，今年(民國五十二年)已無法得手。若欲購山柑種子，須在秋季(山柑成熟前)定購。

梨果標本之製作

【問】：經營橫山中生梨園數甲地，每年有兩次的收穫，現擬將園內及本省各種的梨實採集做成標本，供為研究之用。懇請將下列問題解答為荷。

列問題解答為荷。

(一) 梨實標本做法如何。
(二) 以佛爾瑪林防腐劑浸製是否可以？(新竹縣橫山鄉陳鏡財)


【答】：梨果標本之製作法如下：(一) 先將梨果放于硫酸銅五%溶液內浸二十四小時。

(二) 梨果從硫酸銅溶液取出後用清水沖洗一、三小時。

(三) 將梨果放入亞硫酸水五%溶液內後密封。(翁仁祿)

仔牛身體弱

應注重營養



【問】：水牛母牛生產後，小牛食乳身體瘦弱有甚有效的藥嗎？豐年報上刊載的圖，全是雞鴨豚羊赤牛使用歐羅肥，及一成熟素歐羅肥及一成熟素大肥噴，水牛產後四個月下可以食嗎，食得肥胖要食若干？(花蓮縣秀林鄉鍾金生)

【答】：四個月以後水牛餵與歐羅肥等抗生素補充飼料，是沒有效果的，你的仔水牛體弱，是因為營養不良。每天除吃草外，另給與一臺斤飼料(碎米、大豆餅、米糠、麩皮各四兩另加骨粉及食鹽少許)。這樣飼養三、四個月後就會肥大起來。無須給藥。(李登元)

讀者服務部小啓

張勝利 廖昭三 林樹清 吳朝熙
黃希敬 賴萬吉 張照夫 孫盛偉
嚴萬樹 程萬里 劉彥良 沈進合
顏登植 林榮 蔡豐盛 江慶揚
許仙化

以上各位農友來信的問題，已送請家專解答，請等候本社的回答。

中日牌

料飼全完鷄養

中日牌養鷄完全飼料是

本省首創民營最完善之飼料公司出品，品質精良、營養豐富、無論何種鷄禽，經常使用均有滿意之效果。

種類
初雛用 蛋鷄用
中雛用 種鷄用
大雛用 肉鷄用
六種

中日飼料股份有限公司

臺北市信陽街二三號 電話 三二五五一 三〇六三四

在來種稻熱病特效藥

特點：

一、絕無藥害(據50年度臺中區農業改良場試驗報告)
二、藥效優秀(據50年度臺灣省農業試驗所試驗報告)

三、提高產量(據50年度臺中區農業改良場試驗報告在無發生病害區使用結果增收七%)

注意：避免與安特靈等有機鹽素劑混合最好單獨使用。

製造元：

日本三笠化學工業株式會社

總經理 裕隆商行

臺中市建國路一六七號 電話：四八五五號



(錠ンネーコイダ)