



李、桃、甜味楊桃  
均不適高壓法繁殖

【問】：(一)李、桃、及甜味楊桃等樹，是否可以使用空中壓條法繁殖。  
(二)如可用壓條法繁殖，應該何時施行，用法如何。

【答】：李、桃均不適高壓法繁殖。須用苦桃為砧木嫁接，楊桃亦以酸楊桃為砧木嫁接為佳，惟砧木不易得時，亦可採用高壓法繁殖。

殖。

繁殖方法：在四、五月間，將二、三年生枝條，從先端一公尺附近之直徑二、四公分部份，行寬約三公分連木質部之環狀剝皮後，用泥土包覆，然後再用塑膠紙包之。  
(環狀剝皮後，將處理部份放置一、二個月後，再包覆泥土亦可)，待發根後鋸斷，假植於苗圃。(翁仁祿)

要定購山柑種子

需在秋季以前

【問】：據說，嫁接柑桔(華倫夏)甜橙類砧木。以山柑(野生柑)為最好。因為產地無此類種子，所以煩請貴社給於答覆或是請轉問農業機關，試驗所有否及售價。(苗栗縣銅羅鄉賴進財)

【答】：(一)晚寄西亞甜橙之砧木，仍以酸桔為最佳。山柑砧之晚寄西亞甜橙，雖耐病性較強，但爾後之生長不如酸桔者。  
(二)山柑種子，今年(民國五十一年)已無法得手。若欲購山柑種子，須在秋季(山柑成熟前)定購。  
(三)售價不詳。(翁仁祿)

梨果標本之製作

【問】：經營橫山中生梨園數甲地，每年有兩次的收穫，現擬將園內及本省各種的梨實採集做成標本，供為研究之用。懇請將下列問題解答為荷。


列問題解答為荷。

(一)梨實標本做法如何。  
(二)以佛爾瑪林防腐劑浸製是否可行？(新竹縣橫山鄉陳鏡財)

【答】：梨果標本之製作法如下：(一)先將梨果放于硫酸銅五%溶液內浸二十四小時沖洗一、三小時。  
(二)梨果從硫酸銅溶液取出後用潛水後密閉。(翁仁祿)

仔牛身體弱

應注重營養



【問】：水牛母牛生產後，小牛食乳身體瘦弱有甚有效的藥嗎？豐年報上刊載的圖，全是鷄鴨豚羊赤牛使用歐羅肥，及一成熟素歐羅肥，一成熟大肥噴，水牛產後四個月下可以食嗎，食得肥胖要食若干？(花蓮縣秀林鄉鍾金生)

【答】：四個月以後水牛餵與歐羅肥等抗生素補充飼料，是沒有效果的，你的仔牛身體弱，是因為營養不良。每天除吃草外，另給與一臺斤飼料(碎米、大豆餅、米糠、麸皮各四兩另加骨粉及食鹽少許)。這樣飼養三、四個月後就會肥大起來。無須給藥。(李登元)

讀者服務部小啓

- 張勝利 應昭三 林樹清 吳朝熙
- 黃希毅 賴萬吉 張照夫 孫盛偉
- 嚴萬樹 程萬里 劉彥良 沈進合
- 顏登植 林榮 蔡豐盛 江慶揚
- 許仙化

以上各位農友來信的問題，已送請家專解答，請等候本社的回答。

# 中日牌

## 養雞完全飼料

中日牌養雞完全飼料是

本省首創民營最完善之飼料公司出品，品質精良、營養豐富、無論何種雞禽，經常使用均有滿意之效果。

- 種類
- 初雛用 蛋鷄用
  - 中雛用 種鷄用
  - 大雛用 肉鷄用
- 六種

中日飼料股份有限公司

臺北市信陽街二三號 電話 三二五五一號 三〇六三四號

### 在來種稻熱病特效藥

- 特點：
- 一、絕無藥害(據50年度臺中區農業改良場試驗報告)
  - 二、藥效優秀(據50年度臺灣省農業試驗所試驗報告)
  - 三、提高產量(據50年度臺中區農業改良場試驗報告在無發生病害區使用結果增收七%)

注意：避免與安特靈等有機鹽素劑混用，最好單獨使用。

製造元：

日本三笠化學工業株式會社

總經理 裕隆商行

臺中市建國路一六七號 電話：四八五五號



(錠シネーコイダ)