

五豐化學工業股份有限公司

榮譽出品

富粒多

FOLIDOL E-605



與德國拜耳藥廠獨家技術合作

防治：水稻、棉花、鳳梨等蟲害

大利農

DIAZINON



與瑞士嘉基藥廠獨家技術合作

防治：香蕉鳳梨粉介殼蟲、洋菇之蒼蠅
蔬菜害蟲、環境衛生之臭蟲蚊蠅
及蟑螂等。

克羅莖

CHLOROBENZILATE



與瑞士嘉基藥廠獨家技術合作


防治：柑桔茶葉等之紅蜘蛛卵及成蟲等

上項農藥經農業試驗機關實地試驗認為最優良之農藥，為五豐化學工業股份有限公司榮譽出品，公司：臺北市中正路 1791 號二樓，本公司及各地經銷商青果合作社省農會及各地鄉鎮農會均可購得。

藥子的效果，最近特補助各地設置示範田一千五百處共三百公頃，歡迎農友們隨時參觀。

稻縱捲葉蟲

去年二期作，在中北部局部地區會嚴重發生，應注意及時應用五% DDT 或一% BHC 粉劑每分地四至五公升，或二五% DDT 乳劑一千倍液每分地一百至一百二十公升防治。



病枯紋柏水

但如噴射「巴拉松」等防治螟蟲，也可以同時防治。

小粒菌核病

小粒菌核病（小球菌核病和小黑菌核病的合稱）在二期作也往往引起嚴重的災害。因為被害稻稈基部腐爛，容易在成熟前引起倒伏，稻穗都變成秕，不但收量減少，米質也會變壞。

小粒菌核病的防治方法，目前還在試驗中，但是根據初步試驗結果，應用有機水銀劑防治效果很好，可使用「谷樂生」一千倍稀釋液。因為菌核病菌除了水稻以外，還會寄生雜草，所以，應將畦畔的雜草清除，以減少傳染病源。

殺鼠

靈中

毒的

解救

殺鼠靈類農藥是一種抗凝血劑，毒性很慢，如果繼續入口或由鼻吸入體內，當份量達到中毒程度時，會使血液失去凝固能力，致使體內微血管發生慢性內出血，但因無痛苦，所以初期中毒不易發覺。殺鼠靈的中毒症狀為面色蒼白、精神不振、呈貧血現象。祇有誤食或不斷的由手、用具等間接入口，或不斷的由鼻吸入體內，才會發生慢性中毒。這類農藥成份很低（毒餌含殺鼠靈百分之〇・二五），在農會配發的殺鼠靈粉為百分之〇・五），應無甚大危險性。調配毒餌時，應帶口罩以免吸入口鼻。配藥以後洗淨雙手才可進食。手有傷口者不要直接接觸藥粉。救治方法：注射維他命K或輸血。（洪）