

飼 菊、胡瓜時剩下的汁液用來餵豬。餵給這種含有鹽份的汁液，雖然可以幫助豬的消化，增加豬的食慾，促進豬的生育。可是餵給份量過多時，就會引起食鹽的中毒。

飼 猪的飼料裡，應該摻點食鹽，可是份量過多時，却會引起中毒。食鹽中毒很危險，嚴重時可能致死。所以在餵給醬油粕、鹹魚粉、鹹菜的廢液時，因為含有鹽份，也要特別小心。


飼 本省中部地區的農友，常將醃漬芥菜、蘿蔔或是食鹽，也會引起食鹽的中毒。

飼 是飼料的百分之五十五至七百公分的食鹽，或是食鹽，也會引起食鹽的中毒。

飼 除了醃菜汁液之外，過多的鹹魚粉、醬油粕或是食鹽，也會引起食鹽的中毒。

飼 仔豬每日五至十公分，肉豬、種豬每日十五至二十公分即足。如果超過這個份量餵給，就有發生中毒的危險。

！毒中鹽食的猪心當



游 欽 宣 ..

試驗，一百公斤體重的大豬，一次餵給一百二十五至三百五十公分的食鹽，或是仔豬一次餵給三十至四十公分的食鹽，便會中毒死亡。

含有食鹽百分之五十的魚粉，一日餵給一百公分，連續三至四日，也會使豬中毒致死。

猪發生食鹽中毒，主要的症狀是：精神消沉、口渴喜歡喝水，食慾減退，豬體表面發紅，眼結膜充血腫脹，嘔吐，疝痛失去知覺，視力、動作遲鈍，糞便硬固。

重症者發生癲癇，旋回運動，呼吸困難，痙攣，口流泡沫，四肢間隔性痙攣（每五分鐘一次）。

急性在一至五日內死亡，慢性者引起貧血、瘦削等症狀。

食鹽中毒的治療法如下：輕症者，即時用肥皂水灌腸，灌服蓖麻油五十至一百立方公分（cc），混合溫牛奶或溫水，注射一〇%「安那加」十立方公分（強心），注射「哇過斯質故民」（ワゴスチグミン）二至五立方公分（促進腸部蠕動），靜脈注射「維他治肝靈」（四十至一百立方公分（防止貧血），肌肉注射「妥耳拿」或「巴比土」類三至五立方公分（防治痙攣或類癇）。

病況逐漸好轉後，繼續注射「葡萄糖液」混合「維他治肝靈」六十至一百立方公分，以防止貧血並促進早日恢復健康。

△農業小知識 ▽

△硫酸鋅肥料，因製造方法之不同，有粉狀與粒狀之製品，但氮含量仍相同。（吳）

△利用氯化鈉驅除雞蟲，效果較大，用時宜將白色粉末狀的氯化鈉撒在雞的胸前、大腿和肛門下，背部兩側頭及頸部，可用手指擦撓在羽毛裡。（周）

△柑桔膚斑病多發生於老葉，可以用大生七八三三〇至五〇〇倍，自嫩葉時開始噴藥，每個月一次，三四次可防治。（劉）



市北臺到來枝秀
去處何親無目舉
伊呼招年少位一
氣客伊甲切規常非



伊勤苦母父枝秀
易容無錢市心小萬千
意注單都要心技枝
去門出身華都華秀



虛榮女枝去市都
秀本大繁市都
秀是都華秀
伊了害

不知多少受了害

小顧懷圖文