

臺南、花蓮以北各地區，冬季都適生育栽培，尤以濁水溪以北至桃園沿海岸的砂質土壤，更宜於栽植。臺北延至三月收穫，肉質仍可保持潔白而細膩，不空心，表皮不破裂。

最適的播種期，爲了配合一期水稻插秧，中南部沿海一帶十一月下旬，新竹以北十一月中旬播種育苗爲最理想。苗期二十天，到十二月上旬移植，生長七十至八十天，到立春前後就可收穫。根據歷年氣象記錄，這段生育期間，月平均溫度不會超過攝氏二十度，是我栽培最安定的季節。北部延至三月中旬（春分前後），仍不影響插秧期。

行株距配合品種

兩年前，苗栗縣後鎮農會張先生，向農業試驗所拿去四兩種子試種。他過去從未種過大頭菜，猜想大頭菜的「頭」一定很大，因此移植距離爲行距一公尺，株距六公分，一分地僅栽一千六百多株，結果雖然生育非常優良，但產量却因此大減，每分地只能收穫一千四百多臺斤。

依照我們的經驗，早熟種適於密行密植，砂質土壤適合闊畦定植，畦寬二公尺（包括畦溝）栽四行，行距四、五公分，株距三公分。如此定植，每分地可栽植七千株。晚熟種不適於密植，宜狹畦定植，畦寬一公尺（包括畦溝）栽二行，行距五公分，株距三、五公分，每分地約可栽五千株。移植完畢立刻澆水，如天氣晴朗，宜連續澆幾次。移植時切忌太深，以幼苗根部深淺爲度。

如種子供應充裕，這種塊根蔬菜栽培，最好像栽蘿蔔一樣，用種子直播，不但發根少，且根形較移植爲美觀。播種方法，先照一定栽植距離作淺穴，用鋤頭背把穴中土粒打碎，輕輕壓緊，作成淺盤狀，然後每穴播種子三、四粒，覆蓋腐熟堆肥少許，待幼苗出土後，漸次間拔，留壯苗一株，再施追肥。每分地播種量，約爲移植的四倍。

多用速效性堆肥

去年，屏東縣一位劉農友，第一次栽培雲南大

頭菜，先拿種子由農年社轉到農業試驗所來鑑定，經決定品種確屬不錯，告訴他放心栽植，他就歡天喜地開始栽培，希望生長快，產量多，每分地用堆肥二千臺斤外，再將氮肥和栽培水稻一樣，用六十公升，於是再來信問，大頭菜品種不對了，只長葉子不生根，是何道理？

這種早熟塊根蔬菜，氮肥多用，一定會徒長葉子，每分地既用二千斤堆肥，氮肥就應該少用。這位農友一場歡喜一場空的毛病，就是氮肥多用了。照我們的栽培法，這種生長期較短的塊根蔬菜，最好多用速效性的腐熟堆肥，定植前本田已加用基肥者，追肥可少施。如無堆肥，單用化學肥料亦可。氮肥的配合要注意不宜太多，一般中等土地，每分地三要素的配合比例，應爲硫酸銨二十公升，硫酸鉀二十公升，過磷酸鈣二十公升，混合分三次施用；第一次定植後十天用全量五分之一，點施於株間；第二次定植後二十天，用全量五分之一，條施於株間；第三次定植後三十天條施於行間，用全量五分之一。施肥完畢，隨即覆土。照這樣的用量，決不會徒長葉片。

附註：①本文作者著有「雲南大頭菜加工手冊」一種，即將由農復會出版。②農友們如有栽培大頭菜的問題，請隨時向農業試驗所園藝系李伯年洽詢。



。虧吃的有，利獲的有，菜頭大培栽

大生二十二殺菌劑

DITHANE M-22

大生七十八殺菌劑

DITHANE Z-78

可利生白粉病特效劑

KARATHANE WD

巴生六十九微生物殺蟲劑

BAKTHANE L-69

開路生紅蜘蛛殺除劑

KELTHANE W

出來通—114展着劑

TRITON X-114

出來通—1956展着劑

TRITON B-1956

衛本土壤燻殺劑

VAPAM

尚有他種農藥·函索說明書附郵票八角即寄



臺灣總代理 青象貿易有限公司

臺北市中正路1756號三樓 電話：27467