

香茅草堆積發酵後

可做洋菇栽培原料



賴茂京

【問】：聽說用香茅草做洋菇栽培原料，所產洋菇，有惡臭味，是不是有此說？（臺中市）

【答】：香茅草經過堆積與堆積發酵後，很少有香茅油氣味存在。經試驗栽培，對產生之西洋菇無影響。其材料配法如下：

香茅草 七五—八五公斤

硫酸銨 三公斤

尿素 三公斤

過磷酸石灰 三公斤

炭酸鈣 三公斤（胡開仁）

蘆筍不適水稻間作

【問】：我想在這期水稻裡間種蘆筍，是否可以？如可以，何時間種？（臺中縣大甲鎮陳政治）

【答】：蘆筍不適於水稻間作，但可將水田地改為旱地後栽植。蘆筍之栽植適期為十一月至一月間，故可二期水稻收完後，整地定植。定植後可以間作其他旱地作物及蔬菜。（王進生）

食用甘蔗如何施肥



【問】：①鄙人栽種的食用紅甘蔗，畦寬三·五公尺，株距一公尺，現在發育旺盛，高約一公尺，每株十餘支，是否過多？應留幾支才好？②施肥要幾天施一次，③專用硫酸及尿素可以否？（新竹縣新豐鄉黎相佑）

【答】：①每株分蘖出生數目多，最後成功為原料莖數也多，莖數為影響產量一重要因素，似可不必限制。但可視實際需要，利用培土方法，可控制無效分蘖的繼續出生。②甘蔗施肥次數及日期，往往因時因地而異。

一般言之，秋植甘蔗，在種植前，施基肥一次，植後二月施第一次追肥，翌年二月，施第二次追肥；春植蔗基肥及追肥各施一次，施肥時期與秋種者同。甘蔗為高莖作物，需肥量大，故除氮肥外，磷及鉀肥亦不可缺。三要素施用，可因品種及地力肥瘠情形等而有變更。通常每公頃須素為一五〇至二五〇公斤，磷為七五公斤，鉀素七五公斤。③氮肥使用硫酸或尿素均可。氮肥按施肥次數作等量施用，其他磷鉀肥，則在基肥時作一次施用。（伍文耀）

老鴨毛鬆經大皮層粗厚色暗



【問】：我養着一群老鴨，一部份生蛋已有兩年半以上，一部份生蛋才有八個月，是混合在一處養的。我現在想把老鴨淘汰了，但缺乏鑑別常識，請告訴我嗎？（花蓮縣富里鄉王和先）

【答】：老母鴨與新母鴨的鑑別法，無一固定之標準，一般情形，老母鴨羽毛比較鬆，沒有新鴨那麼緊湊，體軀也略大。在腹部老鴨較腫起，尤其在眼皮部份。腳脛部皮膚老鴨粗厚，同時顏色亦較暗。此外在腔門部份新鴨較鬆大而濕潤，老鴨則較乾硬而堅縮。以上之觀察，比較可靠，請試行分別之。（李登元）

榕樹桑樹繁殖法


【問】：榕樹與桑樹怎樣繁殖？請賜知繁殖時間及繁殖方法。（宜蘭縣三星鄉張溪則）

【答】：（一）榕樹多用枝條插植繁殖。其法於二月至四月，或十月至十一月間，選二年生枝條，摘去大部枝葉，切成長約三十至五十公分，捆綁埋入土中約三分之一，培土壓實，並時灌水即可。桑樹可用枝條插植，或用壓條法繁殖；一般則多用種子播種、育苗、行接木後，再行栽植。（黃希周）

養鴨新藥

安全可靠

效力高強



衛安藥字第〇〇〇〇號

預防治療劑

安全新生素

SAFETY NEWLY BORN ELEMENT

專用最高抗生素配合熱帶地方而成的鴨病特效藥

主治症：鴨瘟（軟腳）、白喉、赤白痢、胃腸炎、丹毒、肺炎、感冒、消化不良、其他惡疫。

絕無其他副作用（保證沒落蛋）

• 全省到處均有出售 •



光洋熱帶畜牧藥物廠

彰化縣線西鄉高埔路14-3號

政府檢驗



合格農藥

世界名廠出品優良農藥總經理

樂農家：瓜類、豆類、蔬菜：銹病、露菌病、炭疽病。

殺也特：薄荷、瓜類：白粉病、柑桔：象皮病（銹蟬）。

鐵地旺：柑桔、茶樹、棉花、蔬菜、紅蜘蛛。

美寶粉：最新全能殺菌劑、替代波爾多液、省力、省時、省錢。

Ekatox：含巴拉松50%乳劑、功效優於巴拉松（富粒多）

興農化學工廠有限公司

臺中縣大里鄉內新村內新路五九號

電話：臺中市2619、4688

信箱：臺中郵局第236號

臺北連絡處：臺北市仁愛路二段46號

電話：38826