香茅草堆積發酵後可做洋菇栽培原料



【問】：聽說用香茅草做洋菇栽培原料，所產洋菇，有惡臭味，是不是有此說？（臺中市　輯茂京）

【答】：香茅草經過提油而堆積發酵後，很少有香茅油氣味存在。經試驗栽培，對產生之西洋菇無影響。其材料配法如下：

香茅草	七五—八五公斤
硫酸銨	三公斤
尿　素	一公斤
過燐酸石灰	三公斤
炭酸鈣	三公斤（胡開仁）

蘆筍不適水稻間作

【問】：我想在這期水稻裡間種蘆筍，是否可以？如可以，何時間種？（臺中縣大甲鎮陳政治）



【答】：蘆筍不適於水稻間作，但可以將水田地改爲旱地後栽植。蘆筍之栽植適期爲十一月至一月間，故可到二期水稻收完後，整地定植。定植後可以間作其他旱地作物及蔬菜。（王進生）

食用甘蔗如何施肥

【問】：①鄙人栽種的食用紅甘蔗，畦寬三．五台尺，株距一台尺，現在發育旺盛，高約一台尺，每株十餘支，是否過多？應該留幾支才好？②施肥要幾天施一次，③專用硫安及尿素可以否？（新竹縣新豐鄉黎相佑）

【答】：①每株分蘗出生數目多，最後成功爲原料蔗數也多，蔗數爲影響產量一重要因素，似可不必限制。但可視實際需要，利用培土方法，可控制無效分蘗的繼續出生。②甘蔗施肥次數及日期，往往因時因地而異。一般言之，秋植甘蔗，在種植前，施基肥一次，植後二月施第一次追肥，翌年二月，施第二次追肥；春植蔗基肥及追肥各施一次，施肥時期與秋種者同。甘蔗爲高蒈作物，需肥量大，故除氮肥外，磷及鉀肥亦不可缺。三要素施用量，可因品種及地力肥瘠情形等而有變更。通常每公頃氮素爲一五〇至二二五公斤，磷酐爲七五公斤，鉀素七五公斤。③氮肥使用硫安或尿素均可。氮肥按施肥次數作等量施用，其他磷鉀肥，則在基肥時作一次施用。（伍文耀）

老鴨毛粗軀大皮膚粗厚色暗



【問】：我養着一群菜鴨，一部份生蛋已有兩年半以上，一部份生蛋才有八個月，是混合在一處養的。我現在想把老鴨淘汰了，但缺乏鑑別常識，請告訴我好嗎？（花蓮縣富里鄉王和先）

【答】：老壯鴨與新母鴨的鑑別法，無一固定之標準，一般情形，老壯鴨羽毛比較鬆，沒有新鴨那麼緊湊，體軀也略大。在臉部老鴨較腫起，尤其在眼皮部份。脚脛部皮膚老鴨粗厚，同時顏色亦較暗。此外在脛門部份新鴨較緊大而濕潤，老鴨則較乾硬而堅縮。以上之觀察，比較可靠，請試行分別之。（李登元）

榕樹桑樹繁殖法

【問】：榕樹與桑樹怎樣繁殖？請賜知繁殖時間及繁殖方法。（宜蘭縣三星鄉張溪圳）

【答】：（一）榕樹多用枝條插植繁殖。其法於二月至四月，或十月至十一月間，選二年生枝條，摘去大部枝葉，切成長約三十至五十公分，掘壕埋入土中約三分之一，培土壓實，並時灌水即可。

桑樹可用枝條插植，或用壓條法繁殖；一般則多用種子播種、育苗、行接木後，再行栽植。（黃希周）



