

公畝應速用硫酸鋸十公斤，以點施方  
式補充肥分。

油菜肥料越早施入，成熟期亦越  
早；又同一肥料量施用回數越少，油  
菜成熟期越整齊，所以我們的油菜，  
應提早施肥及減少施用回數。

(3) 提早噴藥：水稻收穫後，在水  
田為害水稻的害蟲，全部集中為害油  
菜，在點施肥同時，宜用一千倍「  
巴拉松」或「馬拉松」噴射防治。

(4) 作畦：水稻收穫十天後，應即  
開始油菜施肥管理。先將近油菜兩邊  
稻株鋤去，再用百足犁鋤鬆土壤，施入  
追肥，然後用培土犁作畦，並用鋤頭  
修整，畦寬一公尺，畦溝二十公分。

(5) 中耕除草和培土：視雜草發生  
情形，舉行二至三次中耕除草培土。  
(6) 灌溉和排水：油菜生育初期，  
需要比較多量的水份，作畦後，即肥  
料施入後一星期，如不降雨，就要實  
行灌水，以助幼苗發育。但土壤過濕  
時，容易發生根腐爛（近成熟期最易  
發生），所以，灌水和降雨後應注意

### 立即排水。

#### 病蟲害防治

① 姬蟲：為害  
幼苗、植株幼嫩部  
和嫩莢。受害時影  
響結實，減少產量  
。用「馬拉松」或

「巴拉松」八百至  
一千倍噴射防治。

② 黑夜盜蟲：  
切斷幼苗嫩莢使枯  
死。用「阿特靈」  
防治或捕殺。

③ 小菜蛾：在  
結莢期為害葉部，  
發生很快。葉子變成白色網狀。防  
治法：用BHC粉撒佈。

④ 病害：主要病害是細菌性黑斑  
點病，在生長後期發生。防治法：病  
害株不採種。抽苔後噴射「大生」四  
百倍或六一八斗式「波爾多液」。發  
現病株應即小心拔除燒却以防傳播。



法方種二的播直菜油

# 植物生育促進劑

# 現貨供應

# 效果確實



信 用 可 靠

總經銷：信承農產行

溪湖鎮平和里員鹿路66號

農業	好農村	臺北中廣九六〇，苗栗中廣一四一〇，臺中中廣一〇六〇，嘉義中廣一〇四〇，臺南中廣八九〇，高雄中廣一四五〇，臺東中廣八二〇，花蓮中廣一一九〇；下午七時三十分至八時。
測驗	農樂	臺中農民一二九，下午八時三十分至九時三十分。虎尾雲林一一三〇，嘉義公益九三〇，岡山正言一〇一〇，臺東正東一二九〇；星期日下午七時至八時。
廣播	農村服務	臺南勝利八三〇，中午十二時至十二時三十分。
週率	農民之友	新竹台聲一二四〇，下午七時三十分至八時。
廣播	快樂的農家	桃園先聲七七〇，下午七時三十分至八時。
時間	蘭陽之友	宜蘭民本一〇六〇，下午七時三十分至八時。
	快樂農村	屏東民立一〇五〇，下午八時三十分至九時。