

公畝應速用硫酸銨十公斤，以點施方式補充肥分。

油菜肥料越早施入，成熟期亦越早；又同一肥料量施用回數越少，油菜成熟期越整齊，所以我們的油菜，應提早施肥及減少施用回數。

③提早噴藥：水稻收穫後，在水田為害水稻的害蟲，全部集中為害油茶，在點施追肥同時，宜用一千倍「巴拉松」或「馬拉松」噴射防治。

④作畦：水稻收穫十天後，應即開始油菜肥培管理。先將近油茶兩邊稻株鋤去，再用百足犁鋤鬆土壤施入追肥，然後用培土犁作畦，並用鋤頭修整，畦寬一公尺，畦溝二十公分。

⑤中耕除草和培土：視雜草發生情形，舉行二至三次中耕除草培土。

⑥灌溉和排水：油菜生育初期，需要比較多量的水份，作畦後，即肥料施入後一星期，如不降雨，就要實行灌水，以助幼苗發育。但土壤過濕時，容易發生根腐爛（近成熟期最易發生），所以，灌水和降雨後應注意

立即排水。

**病蟲害防治**

①蚜蟲：為害

幼苗、植株幼嫩部和嫩莢。受害時影響結實，減少產量

用「馬拉松」或

「巴拉松」八百至

一千倍噴射防治。

②黑夜盜蟲：

切斷幼苗嫩莖使枯

死。用「阿特靈」

防治或捕殺。

③小菜蛾：在

結莢期為害莢部，

發生很快。葉子變成白色網狀。防治

法：用BHC粉撒佈。


④病害：主要病害是細菌性黑斑

點病，在生長後期發生。防治法：病

害株不採種。抽苔後噴射「大生」四

百倍或六一八斗式「波爾多液」。發

現病株應即小心拔除燒却以防傳播。



法方種二的播直菜油

**農業 廣播 有獎 測驗 廣播 週率 時間**

**好農村** 臺北中廣九六〇，苗栗中廣一四一〇，臺中中廣一〇六〇，嘉義中廣一〇四〇，臺南中廣八九〇，高雄中廣一四一〇，臺東中廣八二〇，花蓮中廣一一九〇；下午七時三十分至八時。

**農家樂** 臺中農民一二九，下午八時三十分至九時三十分。虎尾雲林一一三〇，嘉義公益九三〇，岡山正言一〇一〇，臺東正東一二九〇；星期日下午七時至八時。


**農村服務** 臺南勝利八三〇，中午十二時至十二時三十分。農民之友 新竹台聲一二四〇，下午七時三十分至八時。快樂的農家 桃園先聲七七〇，下午七時三十分至八時。蘭陽之友 宜蘭民本一〇六〇，下午七時三十分至八時。快樂農村 屏東民立一〇五〇，下午八時三十分至九時。

**植物生育促進劑**

**現貨供應**

信用可靠

效果確實



總經銷：信承農產行

溪湖鎮平和里員鹿路66號