


肥綠蓋覆地山良優

藤·葉·卵

勤 國 張

至第二年時，莖葉蓋滿全園，基部枝條會呈半直立性，高約五十公分以上時，即行收割（直立柱條全部收刈）。南部在三至四月間收割，北部地區在十月間收割。所收割莖葉堆置果樹根部周圍覆蓋或供製堆肥用。

卵葉藤是一種多年生豆科植物，植株呈蔓性葡萄地面，葡萄莖長約一至二公尺，枝條節間也能生根，並附着甚多根瘤。
莖部像甘藷蔓一樣不會爬藤纏繞果樹，但是生長繁茂時，莖部枝條有時也能呈半直立性。到冬季漸次落葉，但不全部落光，第二年三至四月間，再開始抽出新芽莖。
莖葉家畜不食，每公頃鮮莖葉產量可達二萬至三萬公斤，肥料成分含量為氮〇·五七%，所以每公頃收刈的鮮莖葉量，相當於五百六十至八百六十公斤硫酸銨肥料，是柑桔園的優良綠肥及覆蓋作物，現由農林廳推廣中。
適宜栽培的地區 卵葉藤適宜較為陰蔽濕潤的地區栽培，在花蓮、宜蘭、臺北、陽明山、桃園等地柑桔園，和雲林、嘉義一帶咖啡園的生長覆蓋情形，都很好，尤以栽植在斜坡地和平台階段的階壁邊沿上，生長情形更佳，對水土保持功用很大。在木瓜、葡萄和果樹園部可以栽培，但在乾燥地區，如無果樹陰蔽之地栽培，則較不適當。
栽培方法 目前都用枝條扦插，成活率很高，每穴種植二至三枝，扦插用枝條長約三十公分（梢部和呈半直立性的枝條不用，因組織幼嫩或過老，成活率低），株距六十至一百公分，行距一至二公尺。
北部在二至三月間扦插（宜蘭地區在十一月至翌年二月間扦插），南部在五月間雨季開始時扦插。扦插方法像種甘藷一樣，一半枝條埋入土中，需加管理，卵葉藤初期出土面。約扦插一週後，開始成活生長。
公頃施用尿素五十公斤，過磷酸鈣二百公斤，氮化鉀五十公斤，以促進生長。



藤葉卵

日本現代製藥株式會社出品

PROSTIN 補樂斯汀注 プロスチン注
感冒，肺炎，氣管支炎。

NEOSTINAL 新絲錫那 No. 1 注
ネオステナール 1 號
緬，山羊，馬之腰痲痺，狗之フ夏イ
ラリヤ，馬之癬，牛之ワセ或コセ，
日本住血吸蟲症。

DEFEROL 得飛龍注 デルフエロー注
クル症，軟骨症，乳熱，骨折，齒牙
發育不全，慢性濕疹，妊娠動物欠乏
維他命 D 症。

臺灣總代理：
臺灣永豐行股份有限公司
基隆市愛四路七十六號
TEL. 3073, 3964

現品供應處：永和行
雲林縣斗南鎮中山路 116 號

最新
植物生長
賀爾蒙劑

一週豐液劑
WEEKLY HARVEST
AUXIN AL***

效果保證 一週豐的用途：
增加收益 一週豐適用於水稻、蔬菜、
甘藷、菸草、茶葉、馬鈴薯、
麥、柑桔、蘋果、蕃茄、
香蕉、鳳梨等果樹及花卉等
全省各農藥行、種子店、農會均售

新品歡迎比較試用！

請合作試用（樣品大贈送）
本公司因接受德國植物金屬荷爾蒙公司之委託，將在本省誠驗其金屬荷爾蒙之效能，故有興趣之農友們請寄明信片，即寄九十瓦樣品乙包。本品分為結類用與植物用二種。
請在明信片上註明使用植物之種類以便送上使用合適之樣品與詳細之說明。 福德貿易股份有限公司啓
臺北縣新店鎮樂埕里石頭厝路一號之一
電話：中 和 一 一 二 二 號

Per Enterprise Co., Ltd.
奇特企業股份有限公司

請合作試用（樣品大贈送）

本公司因接受德國植物金屬荷爾蒙公司之委託，將在本省誠驗其金屬荷爾蒙之效能，故有興趣之農友們請寄明信片，即寄九十瓦樣品乙包。本品分為結類用與植物用二種。
請在明信片上註明使用植物之種類以便送上使用合適之樣品與詳細之說明。 福德貿易股份有限公司啓
臺北縣新店鎮樂埕里石頭厝路一號之一
電話：中 和 一 一 二 二 號