


荔枝爲什麼落果 應當怎樣施肥



【問】：我在山坡地，種植果樹，約二甲有餘，甚爲順利，但下列問題無法解決：
 一、荔枝每年開花很盛，結果亦多，然不特成熟就全部落果，是什麼原因？
 二、應如何處置，才不使不落果？
 三、平時應給何種肥料始能使其生長順利？（臺東縣關山鎮黃金土）

【答】：一、荔枝果實脫落的主要原因有二：一爲開始結果一個月內，凡受粉不良或其他原因，而使種胚不能發育之小果，均自開花後陸續脫落，這種脫落之小果，它的種子祇具有細小之種胚或完全空虛。另一爲凡種仁充實的果實，在正常情形下，均可順利發育，但遇有果實蛀蟲侵入時，即告脫落。荔枝果實發育至圓形以後，仍有脫落現象的，大都與蟲害有關。

二、荔枝在未開花前，或雄花剛開始開花時，可噴佈二五〇馬拉松乳劑五百倍液，每星期噴二次，共噴二、三次，至雄花開放時，即須停止噴藥。待雌花開放至結束（一般在四月上旬），又如前法噴藥二、三次。至五月上旬時，果實即漸由長形發育呈圓形，此時空仁果實大都已脫落，仍留樹上的果實，則多數爲種仁充實之正常果實，如能避免蟲害，將可繼續發育至於成熟。故在蟲害猖獗地區，宜在是時（五月上—中旬）實行果種套袋，則生產可獲保障。

三、荔枝施肥須注意兩點：（一）荔枝最好在每年三、五、七月各施肥一次，最後一次施肥，不可延遲至九月以後，最好於果實採收後立即施肥一次，使在八、九月間抽生新梢，荔枝在八月以前抽生之新梢，至翌年春季大多數均可開花結實，不致影響產量。（二）二、三月間可施豬糞尿一次，五月

、七月各施化學肥料一次，化肥之配合式爲五—九—七，施量須視植株之年齡大小而定；未開花前每年約需化肥一至二磅（其配合式爲五—七—一五），盛產之壯齡樹每年約需化肥十五至二〇磅。（張振宙）

桃之栽培時間及土壤

【問】：一、桃樹何時種植？
 二、土壤以何種爲宜？
 三、在臺中東勢山地種植適宜嗎？
 四、桃果大小是何道理？（臺中縣東勢鎮吳武雄）

【答】：一、桃子種植時期爲十二月至一月，以定植新芽未萌出之一年生或二年生苗爲佳。二、宜於排水良好之輕鬆土壤栽培，排水不良之地栽培之桃，在二至三年生時，生長雖旺盛，但因過濕之故，以後之桃根無法伸長，致地上部衰弱枯死。三、東勢山上年平均日照時間，每日八小時以上之土地，可栽培六月桃。四、桃果小之原因有：①肥力不足，②樹勢衰弱，③結果過多等，其中①②可用施肥法及剪枝法挽回，③可用疏果方法補救。（翁仁祿）

茶園不宜間作鳳梨




【問】：臺北縣木柵鄉山地，栽培鳳梨，是否適宜？柑園及茶園內之閒作是否適當？開始栽培至收穫果實需要期間多久？柑園內栽培鳳梨，密植會不會影響柑樹產量？（臺北縣木柵鄉林榮聚）

【答】：臺北縣木柵鄉，不適宜種植鳳梨。必須在苗栗以南，始可作商業栽培。臺東地區新植之柑園，間作鳳梨，甚爲良好；但茶園不宜間作鳳梨。

鳳梨以秋季八至九月移植最好，春季三至四月種植亦可。鳳梨種植時，苗入土深度，以生長點略入土內爲度。秋植鳳梨在第三年（春植鳳梨在第二年）夏季，收穫第一次，可繼續收二、三年然後廢耕。初植柑桔園間作鳳梨，採密植法，不會影響柑桔生長。四至五年後，鳳梨廢耕，柑桔已長大，以後不可再間作鳳梨。（陸之琳）

親愛的農友們 增加你的收入



來 郵 寄 函

興農大梅花蘿蔔

請參閱秋季興農園藝新知識

輸入元 林興農行股份有限公司
 興農種子行
 本行 臺北市三重市重新路二段二號
 分行 員林鎮光明街七號
 電話：四五三三二
 副撥儲金四〇二八號

最新出品，最有效力的 植物荷爾蒙劑出現了!! 光明牌多快收

(トカイニツク)

多快收 勝過一切植物生長促進劑
 多快收 能 { 改善品質，提早收成
 提高產量，保證效果
 多快收 是 { 農民的良伴
 農作物的保姆

全省各地農會，農藥行，西藥行，種子行均有出售
 中外農藥有出售

光明農化廠 榮譽出品
 總經銷處：臺中市南區福興里
 福中街22巷7號