


# 防治柑橘線虫

請用 **DOW** 陶氏  
土壤燻蒸劑



## • FUMAZONE \*70E (DBCP劑)

為防治線蟲藥劑中，效能最卓著之最新土壤燻蒸劑，較他種殺線蟲藥劑用量少，費用低，其滲透力特強，可防治各種線蟲，尤其對防治根瘤線蟲具有特效，藥效持久，對毒殺線蟲能奏高效。多種作物如果樹、茶樹等永年作物及蔬菜、花木等生育期中，可隨時施用，不發生藥害，可加水澆灌或與液體肥料混用。FUMAZONE\*70E 是目前最進步最有效之毒線蟲燻蒸劑。

臺灣各地：柑園普遍發生黃龍病，其病徵與線虫寄生諸多相似，但在許多次調查之結果，在新埔發現200g之柑桔土壤中含有線虫幼虫數達一萬餘尾，每10g之幼根中亦達二萬餘尾！在陽明山區酸桔砧之桶柑每10g 髮根所含線虫 200~1,000尾者52%，1,000~2,000尾者 32%，2,000尾以下竟無一株。由上列之調查結果，可知本省柑園一般均有線虫寄生，足以阻礙柑桔之成長，早期實施土壤消毒，可避免損失，獲得豐收。

美國·陶氏化學國際公司

台灣總代理：**夏友國際有限公司** 地址：台北市中山北路1段30號  
電話：29361-4

\*TRADEMARK OF THE DOW CHEMICAL CO., U.S.A.