

病器殖生種幾的雞



清 法 趙

雞的生殖器官，多由飼養管理不當，運動缺少，寄生蟲寄生等原因所引起，如果不注意防治，可能遭受嚴重的損失。
茲將雞常見的幾種生殖器官病，及其防治法簡介於後，以供農友們的參考。

卵 秘 病

雞的卵秘病，在產卵期最盛產期間最容易發生。原因為粒飼料過多，運動缺少，卵過大所致。

其他如母雞多吃催產粉，生殖器官肌肉膜收縮機能不全，輸卵管痙攣，輸卵管炎等，也會引發本病。

病狀 病雞精神不安，食慾銳減，伏臥地上，有時無端奔走，屢次傾倒，四、五日後如

不加治療，往往致死。

在未死之前，以手按小腹，可感觸多量硬卵，堆聚腹內。

防治 ①投服蓖麻油一小勺，或在產道中注射甘油或食油，使其滑潤。

②用手指浸油伸入產道探出。

軟 卵 病

生產軟卵，主要是因盛產期中產卵過多，礦物質供不應求或維他命丁缺乏所致。

病狀 所產的卵，缺乏礦物質，即無殼卵。

防治 檢討飼料配合是否平衡，或考慮維他命丁在飼料中的含量。如因缺少鈣質所致，可供給多量石灰粒實、牡蠣殼粉等礦物質飼料，混在飼料中給與。

輸 卵 管 炎

本病發生原因很多，如蟲類寄生，飼料不良，幼雞產卵過早，卵形過大等，都可引起。病狀 主為輸卵管壁發炎，卵白、卵殼等都不能照常行生理機能，致產道疼痛，產卵困苦，下降至為遲緩。

輸卵管內堆積許多卵黃，不能下降，同時腹部下垂，排糞也很痛苦。

病死雞解剖，可見輸卵管內積有大小不同的卵黃，不能下降。

防治 得病後不易治療，及早撲殺為宜。

脫 肛 病


脫肛就是肛門肉質突出而充血。先隔離後照下法施行治療：

①輕症時在手指上塗胡麻油或橄欖油，將脫出部份還納於肛門內。


②脫出部可撒布碘仿一，與硼酸末十配合

選舉着要真正經 忠茂詞


應該要選賢與能 小顧圖



如所咱友農位到
大重與選改會農
示辦或好辦會農
才人的選所靠金



的己自事是會農
家咱替理是事理
管來較起若事理
底到了示若事理



經正真要著舉選
聖是舉選為因友農
能與賢選要該應

的藥劑。或用碘仿與單寧酸各一，木炭末十調配的藥劑亦可。
還納肛門內，縛住兩腳橫臥，經三、四日即可治癒。

輸卵管脫

雞的輸卵管脫，易發生於初產卵雞。產卵過肥時，也容易染患此病。

病狀 常見輸卵管末端，露於肛門外，先為紅紫色，後經與外物接觸，污染即發生炎症。
防治 治療可先用溫水洗滌脫出部份，然後在手指上塗潤滑油，將突出部份送回，並將患雞放置於安靜處，每日用冷水由肛門注進二、三次，使充血退去。
為免其他的雞啄食輸卵管脫出部，必須立即將患雞取出隔離。

優良山地覆蓋綠肥 熱帶葛藤

張國勳

熱帶葛藤是一種多年生豆科植物，纏繞性草本，莖長二至五公尺，生長比山珠豆品種快，是斜坡地的優良覆蓋綠肥作物。

栽培地區、播種適期、播種前的種子處理 和山珠豆相同，請參看第十二卷第二十期第十頁。

播種法和播種量 用種子繁殖的，都採用點播法，每穴播種子三至四粒，薄覆堆肥或燒土，行距一至二公尺，株距六十至九十公分，每公頃播種量一至二公頃。

有雨水時，也可以用枝條扦插繁殖，成活生長很容易，比用種子播種的生長快。播種方法和卵葉藤一樣，請參看第十二卷第二十一期第十六頁。

管理和施肥 可以參照山珠豆施行。（第十二卷第二十期第十頁）但因熱帶葛藤比卵葉藤和山珠豆生長快，所以除草次數可以減少一至二次。

收割 生長茂盛時，莖葉蓋滿全園，即需進行收割，否則莖葉會纏繞果樹。


第一年生收割一次。

到第二年生時，每年可收割二次以上。


收割二分之一莖葉，覆蓋果樹根部周圍，或待稍曬乾約十公斤一捆，掘穴埋覆，作為果園綠肥或供製造堆肥用。

留種 熱帶葛藤的留種，在恒春地區最好，臺南、高雄地區次之，其他地區不結種子，就是會結種，也不飽滿，發芽率低。

種子的採收方法，可參照山珠豆（第十二卷第二十期第十頁）。



熱帶葛藤



農會選舉
開票
注意
利吉



領本真若已
拉振來為當應
警經來實要言諾選
營經來意誠心誠當



清認要買人自補候
領本真無若己甲通
情威手鏡財損命勞