

的藥劑。或用碘仿與單寧酸各一，木炭末十調配的藥劑亦可。
還納肛門內，縛住兩腳橫臥，經三、四日即可治癒。

輸卵管脫

雞的輸卵管脫，易發生於初產卵雞。產卵過肥時，也容易染患此病。

病狀 常見輸卵管末端，露於肛門外，先為紅紫色，後經與外物接觸，污染即發生炎症。
防治 治療可先用溫水洗滌脫出部份，然後在手指上塗潤滑油，將突出部份送回，並將患雞放置於安靜處，每日用冷水由肛門注進二、三次，使充血退去。
為免其他的雞啄食輸卵管脫出部，必須立即將患雞取出隔離。

優良山地覆蓋綠肥 熱帶葛藤

張國勳

熱帶葛藤是一種多年生豆科植物，纏繞性草本，莖長二至五公尺，生長比山珠豆品種快，是斜坡地的優良覆蓋綠肥作物。

栽培地區、播種適期、播種前的種子處理 和山珠豆相同，請參看第十二卷第二十期第十頁。

播種法和播種量 用種子繁殖的，都採用點播法，每穴播種子三至四粒，薄覆堆肥或燒土，行距一至二公尺，株距六十至九十公分，每公頃播種量一至二公升。

有雨水時，也可以用枝條扦插繁殖，成活生長很容易，比用種子播種的生長快。播種方法和卵葉藤一樣，請參看第十二卷第二十一期第十六頁。

管理和施肥 可以參照山珠豆施行。（第十二卷第二十期第十頁）但因熱帶葛藤比卵葉藤和山珠豆生長快，所以除草次數可以減少一至二次。


收割 生長茂盛時，莖葉蓋滿全園，即需進行收割，否則莖葉會纏繞果樹。

第一年生收割一次。
到第二年生時，每年可收割二次以上。


收割二分之一莖葉，覆蓋果樹根部周圍，或待稍曬乾約十公斤一捆，掘穴埋覆，作為果園綠肥或供製造堆肥用。

留種 熱帶葛藤的留種，在恒春地區最好，臺南、高雄地區次之，其他地區不結種子，就是會結種，也不飽滿，發芽率低。

種子的採收方法，可參照山珠豆（第十二卷第二十期第十頁）。



熱帶葛藤



農會選舉
開票
注意
利吉



領本真若已
拉振來本為當應
警經來實要言諾選
營經來意誠心誠當



清認要買人自補候
領本真無若己甲通需
情威手鏡財損命勞