

蘆筍

育苗
定植

技術
改進

——生進王——

本刊第十一卷第五期，本文作者曾向各位介紹過蘆筍(石刁柏)的栽培方法。最近，他有機會到大甲、清水、彰化等地參觀農友們實地栽培的情形，發現要想獲得較好的栽培成績，必需加倍注意育苗和定植的工作。

種子的準備

一合(〇.二八公升)蘆筍種子，約有六千二百粒。因為發芽率為五〇至七〇%，一合種子可以育成三千株左右的苗株。但是除去不良苗株和尚未到達適當苗齡的以後，大約只有一半(即一千五百株左右)可以定植。

所以，依目前本省的栽培密度(即一.五公尺×〇.五公尺)，每十公畝約需一千四百五十株苗株，再顧及氣候因子等，每十公畝應準備一至一.五合種子。

苗床的準備

苗床須選富有有機質的肥沃砂質壤土。砂土過於乾燥，苗株發育較差，不宜作苗床。

蘆筍的發芽日數和育苗期間很長，所以必需注意地下害蟲的防除和肥效的持續問題。

苗床必需用「飛佈達」粉劑處理(每十公畝三公斤)，以免幼苗被夜盜蟲等咬斷。


苗床肥料宜用肥效較長的有機質肥料。每公畝

經風乾後，每隔二至三公分播一粒，然後覆土二至三公分厚，再在覆土上面覆蓋稻草。(稻草需先浸水)

管理

播種後十二天左右，須注意是否出土。如果開始出土，應在下午四時左右除去覆蓋的稻草。但是應將稻草的一部分敷在播種條間，以防畦面過乾而影響幼根伸長，並防止雜草茂盛。

以後，看天氣雨量分佈和土壤的乾濕情形，調節水分的補給；不可過濕，也不能過乾。



施用腐熟堆肥二百五十至三百公升，花生餅五至六公升，過磷酸鈣二至三公升，氯化鉀一.五至二公升(或木灰七至八公升)，都作全面施肥。

為育成三千株的健全苗，必須準備一公畝左右的苗床。苗床的整地應在播種前四至五天舉行。

播種

播種前四至五小時，全畦面澆水。因為發芽日數長，應採用條播；條間距離六至九公分，用小竹子壓成播種條溝，溝深二至三公分。將經過浸種的種子，稍

追肥要看生育情形，每公畝施用(液施)〇.八公升左右的尿素，或一.六公升的硫酸銨；施用豬糞尿更佳。

苗株高三至五公分時，間拔至八至九公分，使苗株發育整齊，促進分蘖。間拔時，為防止雜草茂盛，應用五至六公分切斷的稻草，覆蓋株間。如有雜草，隨時除去，不可放任。為預防幼苗立枯和萎枯，應噴射「大生卅一」五百倍液二至三次。

定植

春季播種的，應在冬季定植(休眠期定植)。秋季播種的，應在春季定植(生長期定植)。方法如下：

休眠期定植法 如下部已黃枯，所以定植時，只留莖部六至九公分，其餘的剪除。定植法如上圖。堆肥溝用牛犁或耕機開掘。覆土不可過深。俟新芽伸長後，培養根莖部，然後漸次培土。定植時不可剪根或晒根，因為剪根或晒根，都會影響蘆筍莖徑大小、株高和莖數等，必須注意。

生長期定植法 因為在生長期定植，不可剪除全部莖葉，也不能留下全部莖葉。最好是將莖葉留二十至二十四公分左右定植。

生長期定植，在定植後不久就進入夏季，土壤易乾易濕，所以應採用右圖的方法。在砂土地帶應在株際覆蓋稻草，以減少苗株乾枯。

