

五豐化學工業股份有限公司

榮譽出品

富粒多

FOLIDOL E-605



與德國拜耳藥廠獨家技術合作

防治：水稻、棉花、鳳梨等蟲害

大利農

DIAZINON



與瑞士嘉基藥廠獨家技術合作

防治：香蕉鳳梨粉介殼蟲、洋菇之蒼蠅
蔬菜害蟲、環境衛生之臭蟲蚊蠅
及蟑螂等。

克羅莖

CHLOROBENZILATE



與瑞士嘉基藥廠獨家技術合作


防治：柑桔茶葉等之紅蜘蛛卵及成蟲等

上項農藥經農業試驗機關實地試驗認為最優良之農藥，為五豐化學工業股份有限公司榮譽出品。公司：臺北市中正路 1791 號二樓。本公司及各地經銷商亦果合作社有農會及各地鄉鎮農會均可購得。


被害稻變成黃色或灰白色，甚至枯死。大發生時因排泄物含有蜜汁，常常引發煤病。稻浮塵子多在葉部為害，雖然數量很多，但除了稻穗被害種粒乾枯變成黑粒外，直接的被害較輕。不過，黑尾浮塵子會傳播萎縮病和黃萎病等毒素病，間接的為害相當嚴重。

防治的方法


稻飛虱是很容易殺死的，只要撒佈一% BHC 粉劑，每公頃四十至五十公斤，就有很好的效果。但還是要早有準備，在七八月就提高警覺，在第二期水稻插秧後三十至四十五天，如有發現稻飛虱成蟲或若蟲集棲稻稈為害時（尤其應注意觀察通風不



圖大放蟲成蟲飛稻色褐
(種常：左。種翅短：右)



圖大放蟲成蟲飛稻背白
(種常：左。種翅短：右)



圖大放蟲成子塵浮尾黑
(雄：左。雌：右)

良的稻田中央部份），即應及早施藥驅除，防止密度增高。施藥時應注意噴到飛蟲集棲的稻稈基部。浮塵子，尤其能傳播毒素病的黑尾浮塵子，對藥劑抵抗性較強，以三% BHC 僅能殺死四〇%，要用「賽文」「馬拉松」或 DDT 等藥劑才能收效。但如施用「巴拉松」「EPN」「速滅松」等藥劑防治蠅蟲，則可同時殺死浮塵子和飛蟲。

洋菇已出生 不宜再噴藥

洋菇生出來後，即不宜在菇舍中噴灑農藥，如果菇體被農藥污染，將嚴重影響臺灣洋菇罐頭的外銷計劃。最近來臺採購洋菇的美商綠巨人公司人員，向本省洋菇業者提出了上面的警告。目前本省洋菇多已進入培養季節，希望栽培洋菇的農友切實注意。又據農復會鄉村衛生組的意見，洋菇採收後，應儘量保持清潔，並分級處理，如有必要，可用含五 PPM 以下的氫水漂洗。（經濟部農業計劃聯繫組）

洋菇生出來後，即不宜在菇舍中噴灑農藥，如果菇體被農藥污染，將嚴重影響臺灣洋菇罐頭的外銷計劃。最近來臺採購洋菇的美商綠巨人公司人員，向本省洋菇業者提出了上面的警告。目前本省洋菇多已進入培養季節，希望栽培洋菇的農友切實注意。又據農復會鄉村衛生組的意見，洋菇採收後，應儘量保持清潔，並分級處理，如有必要，可用含五 PPM 以下的氫水漂洗。（經濟部農業計劃聯繫組）