

的方法亦可，但是在水稻未收割前，播種工作不便，紅豆與水稻共同生育不應超過十天，且在水稻收割時，應小心不要傷害豆苗。  
(六)市上所售紅豆，都儘可作食用，不適於當種子用。(周德雄)

### 冬季季節風強處 不宜栽培紅豆

【問】：(一)東部可種紅豆嗎？中部呢？  
(二)紅豆發育期間時否怕風怕冷？冬季季節風甚強，可否栽培？  
(三)生育日數多少？(彰化縣大城鄉謝恢軒，臺中縣烏日鄉林順堂，彰化縣芳苑鄉謝勳等)

【答】：(一)東部可以種紅豆。中部也可種。  
(二)發育期間，耐旱而不耐寒，所以很怕霜害。冬季季節風強處，不宜栽培。  
(三)生育日數約八十五至九十天。(周德雄)

### 開花後六十天 黃麻最適採種

【問】：黃麻採種，照慣例是特種子成熟後，將種子部份砍下來曬。請問開花後幾天算是成熟適度？又如照慣例，先開花的往往過熟，而未端即不充實，故為免除此缺點，擬逐粒採收，即先開花的先採收，可否？應在什麼程度摘下最適宜？(臺南縣學甲鄉百福村三四號李庭棟)

【答】：黃麻種子有後熟作用。於開花四十天以後採收的，蒴果雖仍綠色，但其後熟作用逐漸完全，胚芽健全。如用指甲戳破種皮，即見綠色子葉，顯示已有發芽能力。  
故黃麻最適採種期，為該麻田大部開花後六十天，果枝下部有五至七粒蒴果成熟，呈黑褐色時，即可將麻株上部果枝割取，集五至六株結成小束，風乾脫粒，採得種子。如果等蒴果實全部變黑褐色時採收，則早

熟者易裂開，遇雨易發芽受損失。意欲欲視開花之先後，蒴果之成熟度，逐粒採收，理論上原無不可，但費時化工，並不經濟實用。(李景元)

### 木棉的適宜土壤

【問】：那一種土壤最適木棉？甚麼時期種植最好？一分地要多少種子？(苗栗縣三灣鄉三灣村甘森昌)

【答】：在本省中南部山麓地帶或山谷中間，鬆鬆之砂質壤土或腐植質較多之土，紅色粘質，或粘板岩之粉碎土，均可栽植木棉。多在春季用種子播種，或在南部五至八月雨季期間，用插木繁殖。栽植距離為五至七公尺，播種量視種子發芽率及栽植距離而定。(李景元)

### 種菸的地可種棉花嗎？

【問】：一、我想利用種植菸葉的旱地種棉花可不可以？  
二、菸葉的病蟲害對棉花有無影響？  
三、種植菸葉所施的堆肥及花生餅等，對棉花有無好處？  
四、菸根、菸芽之辣味，浸入土壤，對棉花有無影響？(花蓮縣鳳林鎮大榮里一村五七一號溫火勝)



【答】：一、棉花在花運之適當播種期為三月，如延至四月中旬播種，則產量顯著降低。如欲與菸草輪作，應配合二者之生長期，並注意棉花宜選排水良好，含有適量有機質之砂質壤土、壤土、植質壤土等之輕鬆土壤。  
二、菸草之猝倒病，蓮紋夜盜蟲，及其他鱗翅目幼蟲等，也可為害棉花。兩種作物發生之病蟲害，應分別防治。  
三、種植菸草所施之堆肥及花生餅等，對棉花亦有用處。惟須加施草木灰或氯化鉀等鉀質肥料，以免氮素過多時棉株徒長，影響產量。  
四、菸草殘根爛腐，不致影響棉花生長。(李景元)

最受四健會會友們歡迎的

## 四健牌 超級配合飼料

含有美國最新鷄用藥 Nf-180 可預防球蟲病、鷄白痢、氣管炎等十三種鷄病，並促進成長，改良肉質，增加產卵。



小鷄用—可獲百分之百的育成率。



中鷄用—健壯骨骼、卵巢、輸卵管。



生蛋用—提高產卵率確保養鷄實利。



製造廠：四健飼料股份有限公司榮譽出品

地址：臺北市北平路30號  
電話：25574 25157

# 大肥啾

抗生素綜合維他命礦質補助飼料

飼料店，  
農會均售



促進產卵  
預防疾病



益源製葯所

台北市羅斯福路三段二七二號