

六、整地要點

間作物肥料施用之後，隨以牛拖小型刈耨，使肥料與土壤充分拌和，且袋鬆碎把平淺畦，再行開溝播種花生。

七、播種花生

每畦宿根甘蔗都可間作花生一行或兩行，但因二者經濟純收益相差很小，為操作管理方便計，在淺畦正中夾間作花生一行較好，並應實行密植，每隔十公分點播精選飽滿種籽一粒。

八、種籽預播

要花生發芽整齊，可將種籽浸漬於「烏斯普龍」〇・二％溶液中一至三小時然後播種。
為防止植株萎凋，每公斤花生種籽可用「西藥生」或「賜保根」約四分拌種處理。

九、缺株補植

蔗頭在萌發整齊後如有缺株，宜即旋行分株補植。花生在發芽整齊一兩日內隨予補播，可以減少五至十％的缺株損失。

十、共生管理

宿根甘蔗和間作花生共生期間的各項田間操作，除開培土有待花生採收後進行外，其餘的都可依照慣例舉行。

間作花生宜勤除草中耕，開花盛期（播後四十至五十日）如能灌溉一次，最有助於花生和甘蔗的生育。最後一次中耕除草時，併以鋤或耙仔

施行凹形培土（一般粗放的凸形培土不好），以利子房柄伸入土中並結實。

十一、花生收穫

花生在播種後一百二十日左右，莖葉變黃，下部葉片開始凋落，莢果大部份已經飽滿，莢殼內側網脈粗黑之時，即宜選擇晴天採收。

莖葉殘株，均勻置於蔗株兩旁，待將宿根甘蔗的氮素追肥，施於其上，隨用牛牽埋入土中，併行入土兼大培土。

十二、病蟲鼠害

花生的病害蟲害，可依照單作時防治。

由於花生成熟初期，宿根甘蔗將行封壟，同時恰逢乾季末期，很容易遭受綿蚜蟲為害。

野鼠也會嚴重為害花生莢果和宿根蔗莖，所以為確保產量和多獲收益，必須認真注意防範。

栽培蘆筍的新方法

本省栽培蘆筍，多採取軟化筍。但是因受高溫影響，本省軟化筍的品質較差，尤其在七、八月間所生產的軟化筍，外皮厚硬，纖維也多。

為打開外銷市場，本省今後栽培蘆筍，應以採收綠筍為目標。綠筍不但營養豐富，產量也高；但是應將行株距離小至一・二公尺×〇・四公尺，以提高單位面積株數。（王進生）

一致養雞・豬・鴨的各農家的好消息

防治貴家禽畜疾病、把牠們餵肥養大、增產優良的蛋・肉

這就是增加貴家收入唯一的近路！


費用極小，用法簡單——ロメジンソーダ與ベキシソ只更溶於貴畜的飲料水或混入飼料中就可達成目的。請立刻試用。

最新禽畜驅蟲藥

預防／治療，雞病的特效藥

動物用

動物用



禽畜也和人一級，體內所有蛔蟲寄生，決不能肥大的。請把ベキシソ每月一次定期的給貴家禽畜吃而看牠們一天比一天的肥大。

（包裝） 30公分，100公分，500公分。

對家雞患染的一切疾病有顯著優秀的功效。雞在雞時尤易染病，這時期給與ロメジンソーダ，預防的效果更大。

（包裝） 50公分，100公分，100片桶

田迎製藥

全島有名藥店發售