

類、豆類等，冬季應栽植於同一平坦地的較高處。耐霜的蔬菜，如甘藍、結球白菜，則應栽植於較凹處。

河川、池塘、水路等附近，應栽植不耐霜的蔬菜。

二、霜害季節不要行深度的中耕。雜草則應儘量拔除。

三、番茄、甜椒、胡瓜、南瓜等苗床，宜用塑膠布覆蓋，以防止地溫發散，並防寒流直接吹襲。植物體覆蓋塑膠布時，周圍宜用土壤蓋三至五公分厚，以提高保溫效果。

四、利用煙燻及加熱減低損害：寒流來襲前，在番茄、甜椒區風頭堆積足夠的生草（生草堆下面須放乾草，始能引火。而且生草須與泥土混合，俾能緩慢煙燻），引火用煙燻蓋作物，並促空氣流動，以減輕霜害。

但是如果火力過強，熱氣流上昇，反會將周圍冷氣誘入園內，減低效果，必須注意。

五、勵行畦間灌溉，但是灌溉水必需流動，而且不可過深；如果灌溉水停流畦間，效果較差。

每年十二月至次年二月，農作物常受到霜害。例如今年二月間，番茄、甜椒等作物就曾遭受嚴重的損失。下霜季節快到了，各位如能注意上述幾點，一定可以減輕或避免霜害。

但是如果火力過強，熱氣流上昇，反會將周圍冷氣誘入園內，減低效果，必須注意。

亞麻夜盜蟲的防治法

杜金池


本省亞麻產區，近年來普遍發生夜盜蟲類害蟲，嚴重影響亞麻栽培事業的發達。今年的亞麻栽培期已經到了，下面介紹防治該蟲的幾種方法：

一、捕殺葉上幼蟲：小面積發生，或害蟲發生數量不多時，可用人工捕殺，但如甘藍夜蛾、粟夜盜蟲等，均日夜出，捕殺宜於夜間進行。

二、搜索幼蟲潛伏場所捕殺。

三、注意亞麻田附近是否栽有夜盜蟲容易發生的作物（參看上期十四頁），並隨時觀察是否發生夜盜蟲，俾早期防治。當鄰近田園已大發生時，可作明溝遮斷，防止幼蟲侵入為害。

四、撒佈農藥：按照臺灣省植物保護技術審議委員會核定的五十一年度植物保護推廣方法，亞麻夜盜蟲類可噴射二五% DDT 乳劑二百五十倍稀釋液防治。



害霜止防煙燻

植物生育促進劑

現貨供應

信用可靠

效果確實



總經銷：信承農產行

溪湖鎮平和里員鹿路66號