

擬尺蠖

爲害白菜甘藍等蔬菜的蟲害

李淳陽

在臺灣，爲害白菜、甘藍等蔬菜的害蟲，有斜紋夜盜蟲、擬尺蠖、菜心螟、切根蟲、大菜蛾、小菜蛾和黃條葉蚤等多種。其中，黃條葉蚤已經在本刊第十二卷第十八期刊載過了，現在來說明擬尺蠖這一種發生很普遍的害蟲。

擬尺蠖的幼蟲，除了爲害白菜、甘藍、蘿蔔、豌豆等菜類以外，還可以爲害亞麻、胡蘿蔔、番茄、芋麻、牛蒡、可可等作物，是很常見的害蟲。

拱背前進

幼蟲體色鮮綠，身體兩側各有一條不大明顯的白色線紋，最大的一個特徵，是身體尾部較大，向頭漸縮小。頭部和腹部後端各有腳三對，中部無腳。幼蟲步行時，無腳的中央部份向上拱彎（請看次頁上圖），因爲有這種習性，所以有「擬尺蠖」的名稱。

作繭變蛹

幼蟲在二至四星期中長成，開始變蛹（請看次頁下圖）。變蛹前，在葉間吐絲做繭，經過十至十四天後，羽化變做蛾子出來。

化蛾產卵

蛾子暗褐色，前翅中央有一銀色斑紋，白天不太活動，夜間才出來，但也會在日間出來產卵。卵很小，白綠色，圓形，一粒一粒生在菜葉上。

怎樣防治

要防治這種蟲，在蔬菜生長初期，用二五〇DDT乳劑加水五百倍，一〇％BHC乳劑一千倍，每七至十天噴射一次。

如在收穫前三星期發生，應改噴五〇％「馬拉松」乳劑五百至八百倍，或三・五％「魚藤精」乳劑二百五十至五百倍稀釋液。

注意：「馬拉松」和「魚藤精」也只能用到收穫前五天。

不論如何，請絕對不要在蔬菜上使用「安特靈」或「巴拉松」。因爲這二種藥毒性強烈，用法不對時，可能傷害自己或別人健康，甚至致人於死。

中華植物保護協會推廣

最便宜

最安全 稻穀甘藷簽倉庫用藥

最新

亞洲化學股份有限公司 榮譽出品

保滿丹

粉劑

一斤稻穀祇花 八厘錢

一年不生蟲——天下最便宜的保險費

每袋一、六壹斤裝，出廠價格二十二元

亞洲化學股份有限公司

公司：臺北市武昌街一段七號三樓

電話：三一九九四

工廠：臺北縣中和鄉四十張