

五豐化學工業股份有限公司

榮譽出品

富粒多

FOLIDOL E-605



與德國拜耳藥廠獨家技術合作

防治：水稻、棉花、鳳梨等蟲害

大利農

DIAZINON



與瑞士嘉基藥廠獨家技術合作

防治：香蕉鳳梨粉介殼蟲、洋菇之蒼蠅
蔬菜害蟲、環境衛生之臭蟲蚊蠅
及蟑螂等。

克羅萊


CHLOROBENZILATE



與瑞士嘉基藥廠獨家技術合作

防治：柑桔茶葉等之紅蜘蛛卵及成蟲等

上項農藥經農業試驗機關實地試驗認為最優良之農藥，為五豐化學工業股份有限公司榮譽出品，公司：臺北市中正路 1791 號二樓，本公司及各地經銷商青果合作社省農會及各地鄉鎮農會均可購得。



甘蔗的防腐處理

適時採收 馬鈴薯應在莖葉變黃時採收，如葉枯乾，則澱粉含量已降低，品質差，而且容易感染疫病，在運輸中腐爛。

應在 地上 部呈 淡黃 綠色 時採 收，以 減少 病菌 腐爛 的機 會。

應在 地上 部呈 淡黃 綠色 時採 收，以 減少 病菌 腐爛 的機 會。

甘蔗應在尚未降霜前採收。甘藷傷口治癒 採收的甘藷塊根，選別後裝麻袋或草袋，貯藏在攝氏三十三度，濕度九〇%左右的場所。這樣經過四天後，傷口就完全治癒，而且可抑制甘藷腐敗病和黑痣病菌的繁殖，但是應在攝氏十五至十六度下貯藏或運輸。

雙傷口治癒方法和甘藷相同，但所需日數長一倍，即八天左右，並須增加濕度至九五%。

馬鈴薯傷口治癒 採收的馬鈴薯塊莖，選別後放置通風場所，風乾表皮，使傷口自然治癒。


在風乾中，為防止陽光直射，塊莖表皮變綠，堆積厚度不宜超過九十公分。風乾時間最少需二星期。

△農業廣播消息▽

△花蓮區農業改良場農事作業指導（好農村廣播），本月二十二日廣播「收穫乾燥期專賣法令之解釋」，二十九日「養乳羊來彌補家庭的需要」。

●石勺柏（蘆筍）

請採用利益最多之品種「美麗華盛頓」由美國新進口之種子。



一九六三年春季
新知識
附郵票參元即
寄

興農種子行

請願客來
信時利用
「三重二
號信箱」

輸入元 林興農行股份有限公司
本行 三重市重新路三段一〇八號
電話 四五三三二號
劃撥儲金四〇二八號
信箱 三重二號