

五豐化學工業股份有限公司

榮譽出品

富粒多

FOLIDOL E-605



與德國拜耳藥廠獨家技術合作

防治：水稻、棉花、鳳梨等蟲害

大利農

DIAZINON



與瑞士嘉基藥廠獨家技術合作

防治：香蕉鳳梨粉介殼蟲、洋菇之蒼蠅
蔬菜害蟲、環境衛生之臭蟲蚊蠅
及蟻蟻等。

克羅萊


CHLOROBENZILATE



與瑞士嘉基藥廠獨家技術合作

防治：柑桔茶葉等之紅蜘蛛卵及成蟲等

上項農藥經農業試驗機關實地試驗認為最優良之農藥，為五豐化學工業股份有限公司榮譽出品，公司：臺北市中正路 1791 號二樓，本公司及各地經銷商青果合作社省農會及各地鄉鎮農會均可購得。



甘藷的防腐處理

應，才可減少腐爛的機會。方法如下：
適時採收 馬鈴薯應在莖葉變黃時採收，如莖葉枯乾，則澱粉含量已降低，品質差，而且容易感染疫病，在運輸中腐爛。

應在 地上 部呈 淡黃 綠色 時採 收以 減少 腐爛 病菌 侵入 的機會

甘藷應在尚未降霜前採收。
甘藷傷口治癒 採收的甘藷塊根，選別後裝麻袋或草袋，貯藏在攝氏三十三度，濕度九〇%左右的場所。這樣經過四天後，傷口就完全治癒，而且可抑制甘藷腐敗病和黑痣病菌的繁殖，但是應在攝氏十五至十六度下貯藏或運輸。
傷口治癒方法和甘藷相同，但所需日數長一倍，即八天左右，並須增加濕度至九五%。
馬鈴薯傷口治癒 採收的馬鈴薯塊莖，選別後放置通風場所，風乾表皮，使傷口自然治癒。
在風乾中，為防止陽光直射，塊莖表皮變綠，堆積厚度不宜超過九十公分。風乾時間最少需二星期。

△農業廣播消息▽

△花蓮區農業改良場農事作業指導（好農村廣播），本月二十二日廣播「收穫乾燥期專賣法令之解釋」，二十九日「養乳羊來彌補家庭的需要」。

●石勾柏（蘆筍）


請採用利益最多之品種「美麗華盛頓」由美國新進口之種子。

一九六三年春季

新知識

附郵票參元即

寄



興農種子行

輸入元 林興農行股份有限公司
本行 三重市重新路三段一〇八號

請顧客來
信時利用
「三重二
號信箱」

電話 四五三三二號
割接儲金四〇二八號
信箱 三 重 二 號