



趙法清

冬春容易流行的

豬副傷寒病

豬的副傷寒病，又叫做傳染性腸炎、壞死性腸炎或沙門氏桿菌症，以冬季和春末最常流行，且多發生於二個月到六個月的小豬，死亡率很高，可達五〇%以上。

現將豬副傷寒病的病因、病狀以及防治方法簡介於下，以供農友們參考。

發病的原因

豬的副傷寒病原菌有多種，主要是豬霍亂桿菌和豬傷寒菌。
斷乳過早，突然變換飼料，喂給缺少營養的飼料（如維他命不足），或營養失宜等，都可誘發本病。
豬舍破舊，場地不清潔時，容易發病。年齡較大的帶菌豬是一種媒介。

發病的症狀

本病的潛伏期通常為二至三日，長的有數週，病狀可分為急性、亞急性和慢性三種。
①急性：呈敗血病狀，發高熱，體溫達四十一至四十二度，身體倦怠，不吃飼料，常常

嘔吐或下痢。此外也併發肺炎，呼吸困難，咳嗽，有時現動血、跛行、痙攣。

體表全面或耳翼、鼻端、下腹、內股以及下肢等處，呈紅色乃至紫紅色。一至數日內死亡。

②亞急性：病豬食慾不振，呼吸促迫，下痢，有稽留熱候。皮膚現有赤色或紫色斑，或有濕疹樣發疹，漸次衰弱。經過十日至兩週死亡，或轉移為慢性。

③慢性：主要病狀為頑固下痢，排灰白、淡黃、暗綠色惡臭便，有時混有血液。常現弛張熱，結膜炎，逐漸衰弱而死亡。病程經過數週，或數週以上。

剖檢患部時，可發現潰瘍性或「狄扶的里」性腸炎。

防治的方法

應將病豬和健康豬隔離，並注意豬舍清潔和管理，或注射豬副傷寒菌苗預防亦可。
治療可用磺胺類和抗生素內服或注射。
磺胺類藥物治療，服用「磺胺嘧啶」比「磺胺嘧啶」時效力大，「磺胺二甲嘧啶」也是良好的治療預防劑。
為使磺胺類藥物效果增高，最好將數種磺胺類藥配合使用。

抗生素如

「金徽素」、

「土徽素」、

「氯徽素」以

及 Sulfadiazine 都

有良好的效果

此外可注射

豬肺疫和腸炎

的混合血清治

療。

大生七廿八

「大生七廿八」和「大生廿二」的主要成份不相同，前者是含亞鉛，後者是含錳的殺菌劑。但據本年頒行的植物保護推廣方法，這兩種藥劑都可用來防治大豆銹病和番茄晚疫病。(洪)

洗過農藥倒塗內 小心處理正應該

小西文
小顧圖



農友大看無害
要時除除要
所成害除
知除牙噴
害蟲材



農藥洗過
有農藥隨
春農藥處
家農藥亂
知真內不
害屬內該



「獅火」噴射已做
噴洗無噴
器噴注意
去尾