

### 當心夜盜蟲

紫雲英跡地，夜盜蟲發生也多，應用「飛佈達」粉劑處理土壤防除。噴射二五多DDT乳劑五百倍液，對夜盜蟲很有效，但在栽培瓜類時，苗期不可噴射DDT或BHC乳劑，所以，應先用「飛佈達」粉劑每十公畝四公斤左右，撒佈田面後耕耨，或作播種溝將該粉劑撒佈溝底，並與土壤混合，再覆蓋細土，然後播種或定植。

### 多施過磷酸鈣

紫雲英跡地，應多施過磷酸鈣，以利蔬菜根群發達，促進生育。即使在栽培前耕犁風化土壤，土中仍帶酸性，為了減低土壤的酸害，應多用過磷酸鈣。過磷酸鈣雖為生理酸性肥料，但施用在土壤時，能夠沉澱酸害物質，減低酸害，促進蔬菜的生育。每十公畝地應多施過磷酸鈣三十五至四十公斤。(王)

### 嘉南大圳渠道內面工程 提高灌溉效率·增加灌溉面積

嘉南大圳渠道內面工程，正在實施內面工程。這項工程，自從民國四十九年一月開工，預定六年完成。現在是施工的第四年。


為了節省用水，提高灌溉效率，嘉南大圳的渠道，正在實施內面工程。這項工程，自從民國四十九年一月開工，預定六年完成。現在是施工的第四年。據估計，全部工程完成後，每年可以節省水量一億零四百萬立方公尺；用這些水來擴充水稻、甘蔗、雜糧的灌溉，受益面積將達十二萬三千四百公頃，每年可增產稻谷三萬五千九百公噸，甘蔗二千九百六十三公噸，甘薯一萬九千五百五十七公噸，花生二千零七十五公噸。(樊蕪環)

### 植物生育促進劑

# 現貨供應

信用可靠

效果確實



總經銷：信承農產行

溪湖鎮平和里員鹿路66號