


的部葉等藍甘菜白害為

螟 · 心 · 菜



蟲成螟心菜

陽 淳 李

假使你所種植的白菜、甘藍等蔬菜葉上，有不大的小瘡孔，有的完全透過，有的只剩一層薄薄透光的葉表皮（次頁上圖），而且在撥動菜株或圃場週圍的雜草時，有很多小小的蛾子（約八公厘長）飛起來，這大概就是菜心螟了。

蛾子日間活動

這種蛾子很容易看到，因為它是日間活動的。蛾子停在雜草上或菜葉上時，很容易看出翅上有很明顯的三個山狀的斑紋（右圖）。母蛾產卵在葉上，卵黃白色，很小，每處生一至三粒。

幼蟲綠色敏感

經過數天，綠色的幼蟲便由中孵化出來，在菜葉裡面吃葉肉，只留透光光的表皮。再經過一些日子，因為菜葉長大或其他原因，這一層表皮大部份

會破裂，也就變成完全透過的蟲孔了。這種害蟲的幼蟲，很容易和別種幼蟲分別出來，因為它們神經很過敏，被摸一下或動一下就會跳起來，吐絲滑落地上。

吐絲 做繭 化蛹

幼蟲經過十至三十天就長大，約八公厘長，在葉裡開始變蛹。化蛹前，先吐絲做繭（次頁下圖），經過一至二星期成蟲羽化出來，再繼續另外一代。

有效的防治法

在蔬菜生長初期，使用二十五% DDT 乳劑加水五百倍，或十% B H 卵乳劑加水一千倍，每七至十天噴射一次。收穫前三星期如有發生，改用五十%「馬拉松」五百至八百倍，或三·五%「魚藤精」乳劑二百五十至五百倍釋液噴射。「馬拉松」和魚藤精，也應在收穫前五天停止使用。

世界上只有一種奇妙的家畜驅蟲劑

西德拜耳大藥廠出品

牛猪安 粉末

可吃、可塗、可噴、可擦

全省農民之友

元山公司 獨家總經銷

牛、猪、狗、羊、雞
都可以用



詳細請函臺南郵局一六九號信箱元山公司即送或查閱豐年報十月一日十二卷十九期也有詳載
原名：NEGVON
日名：ネグボン
乳牛牧場、種畜場、養猪場必備家畜內外寄生蟲兼用驅蟲劑