



友農泉水江

臺南縣麻豆鎮江水象農友，第一

試種露地洋香瓜

每顆重達三臺斤

以後，我依照指導員的指示去做，產量一直很好。（屏東縣鹽埔鄉新二村三號盧天佑）

所致，凡是菌絲體變成菌蕾時，水分供給應特別小心，如栽培床過份的乾燥，可噴撒少量的水，方法是次數多量少。

農友經驗

栽培草菇 注意灌水

今年六月初，我種了四、五十坪的草菇，約十一天後，子實體萌出，我欣喜欲狂的趕快提水到菌床每一個角落澆水。可是第二天再去時，有的枯萎了，有的腐爛了，剩下的只是寥寥無幾。

失望之餘，我便去請教指導員。指導員說：「這是由於水份供給不當

次試種露地洋香瓜，每株產量達二十臺斤左右，每一果實小者一臺斤，大者三臺斤多。（麻豆鎮農會陳再福）

雜交玉米糊仔栽培

每分地產量五百斤

雙雜交種玉米選地不嚴格，除了保水力很差的砂土，和會使根部發育不良的粘土外，其他任何土壤都可栽培。

二期水稻收割前二十三天（約水



會厚觀米玉交雜雙

採用南北向行。

播種後經過四、五天發芽，第八天押開稻株，視土面水分情形灌溉一次。以後每隔十天再灌溉一次。第十

四天時行開苗，每穴留一株。中耕培土在施肥後舉行。雌花抽穗後，注意每株不超過二果穗。

施肥共分三次；播後第十五天施第一次，每公頃硫酸銨一百三十公斤，過磷酸鈣九十公斤，氯化鉀五十公


斤，混合施在株邊二寸處。第三十天後二次施肥，施肥量和

第三十天後二次施肥，施肥量和

這個標誌給您農作物之豐收！

日本北興

水銀ボルド CP



使用ホクコー
水銀ボルド一胞霜增產
可使植物葉細於霜增產
增厚，故對於霜增產
霧害之抵抗力增產
強，可確保增產
之目的

日本製
D.D.V.P.原體97%
現貨供應

最良之
病害優

蕃茄 馬鈴薯

殺菌劑

ホクコー
マシン油乳劑
95%
防治柑桔收穫後
越冬病蟲害請用
ホクコーマシン
油乳劑95%

◎請向各地經銷處接洽

大勝貿易有限公司

臺北市太原路20號
電話：45877·41337

