


④施肥過於濃厚，可致新葉枯萎。
 二、所寄葉片中有多數穿孔者，可能是金龜子為害所致。近年來各地所種荔枝，已普遍受其害。可噴佈DDT乳劑（二五〇乳劑，稀釋三百倍）或地特靈乳劑（二五〇乳劑五百倍）防治之。

三、過分輕鬆之沙土，不宜栽培荔枝。既已栽培，唯一補救之方法為多施堆肥，及多用有機肥料，乾燥時宜用草類厚加敷蓋。據來函所述，在該等地區種植龍眼，當較荔枝為適宜。（張振宙）

宜蘭地區栽培甘藷

可種「臺農五八號」

【問】：一、在宜蘭地區山地栽培甘藷，以何品種最適宜？
 二、每公頃甘藷收穫量多少公斤？
 三、甘藷蔓有多少？
 四、每公頃可栽多少株，何時栽植最適宜？
 五、肥料怎樣配合？



六、甘藷收穫後種莖，是否有影響？
 宜蘭市進士路四十六號楊吉文

【答】：一、可栽培甘藷「臺農五十八號」，本品種耐濕。
 二、春植每公頃可收五萬二千臺斤，秋植且超過此數。


三、「臺農五十八號」蔓收量，比普通甘藷品種稍多，因剪後恢復快，且能抗縮芽病。
 四、一年四季均可種植，春植夏秋植均佳。每公頃可栽三千株，行距三尺，株距一尺。

五、甘藷肥料每公頃用量：
 第一標準
 堆肥七、五〇〇公斤（基肥）
 過磷酸石灰一五〇公斤（基肥）
 硫酸一一二、五公斤（基追化各半）
 氯化鉀一五〇公斤（基追肥各半）
 第二標準

堆肥二、〇〇〇公斤（基肥）
 草木灰四八〇公斤（追基各半）
 六、甘藷與生薑不同科，可以前後作。（繆進三）

花椰菜如何留種

【問】：我種了些花椰菜，看起來品種還好，應如何留種？（雲林縣西螺鎮鹿場里五三號廖福星）



【答】：一、花椰菜容易與甘藍、芥藍、及花椰菜品種間雜交退化。故留種時，在栽植地周圍八百公尺，均無雜交作物，始可保證其採收種子之純正。
 二、抽苔後即間拔花枝，最後僅留花蕾中心之強健的花枝數枝就可。間拔的切口，宜用硫磺華，石灰或水泥塗布，以防由切口腐爛。注意霜害，並經常噴射大生七八與馬拉松混合液，以預防病蟲害。

三、種子採收，以花枝先端的莢果內，種子已呈淡褐時為適期。採收後宜放在布帆追熟後才陽乾。追熟時不可堆積過度，以免引起發酵。（王進生）

大豆葉面施用尿素

倍數適當不會有害



【問】：大豆栽培，使用尿素葉面撒佈，是否會發生不良後果或藥害？（屏東縣萬巒鄉泗洲村永平路四四號林清雲）

【答】：一、大豆葉面施用尿素，尿素稀釋液如在三五〇倍以上，是不會發生肥害的。
 二、春秋兩期大豆，葉面施用尿素，可使大豆產量增加，如夏季施用，反而減產。春作大豆施用尿素八五〇倍稀釋液，可增產六、九%；秋作大豆可增產六、三%。施用尿素的時期，以稀釋後三十五天以內為宜。（劉文慶）

養鴨新藥
 安全可靠 效力高強

預防治療劑
安全新生素
 SAFETY NEWLY BORN ELEMENT

專用最高抗生素配合熱帶地方而成的鴨病特效藥

主治症：鴨瘟（軟腳）、白喉、赤白痢、胃腸炎、丹毒、肺炎、感冒、消化不良、其他密疫。

絕無其他副作用（保證沒落蛋）

• 全省到處均有出售

光洋熱帶畜牧藥物廠
 彰化縣線西鄉高埔路14-3號

最新出品植物荷爾蒙劑出現了

光明牌多快收
 (トカイニツク)

多快收 勝過一切植物生長促進劑

多快收能 改善品質 提早收成 提高產量 保證效果

多快收是 農民的良伴 農作物的保姆

光明農化廠 榮譽出品
 總經銷處：臺中市南區福興里福中街22巷7號