


當心乳豬患貧血？



欣聯張

飼養在水泥或鋪磚地面的豬，尤其是三至五週齡的乳豬，很容易發生貧血；發育愈快，貧血愈重，請農友們當心！

飼養於水泥或鋪磚地面的豬，很容易發生貧血，尤其以三至五週齡的乳豬，最容易發生；因為初生數週內的乳豬，還不能吃飼料，且母乳中鐵質供應不足，致使血液中減少「血紅素」和「紅血球」而發生貧血。

主要的症狀

有時營養發育都很好的乳豬暴斃，經解剖後才看出是貧血。發育越好，貧血情況越嚴重。但有時從外觀症狀可察覺貧血，主要症狀如下：大約生後三至四週時開始精神萎靡，軟弱，嚴重的白痢，稍微動作就呼吸困難，消瘦，注意觀察可見粘膜（尤其眼結膜）蒼白等一

般貧血症狀。解剖豬體時，可發現流出的血液很稀薄，一切臟器呈現淡色，心臟右心室擴大，肝臟病變明顯、腫脹，剖面可見小葉，中心靜脈鬱血，周圍呈黃色紋理，如肉荳蔻樣。脾臟腫脹。

有效的藥劑

一胎中，如發現有一頭貧血，應立即將全胎仔豬治療。最好注射「菌葡萄聚糖鐵液」一至二立方公分於肌肉內，很快就能回復。或灌服鐵水（硫酸鐵八公分，硫酸銅一公分，水一百五十立方公分），每頭每次一匙，每天一至二次。

或以鐵銅糖漿（同上鐵銅用四〇%糖漿一百五十立方公分溶解），每次三十至五十公分，塗於母豬乳頭上，每天一至二次，使乳豬吸乳時吞食，即可增加「血紅素」和「紅血球」。

臺灣氣胺公司出品的鐵劑注射藥 Pigdex，或日本衛材公司出品 Ferobol 注射藥，對乳豬貧血有治療和預防的效果。

預防的方法

乳豬貧血症的預防並不難，哺乳早期供給鐵劑就可收效。最簡單的方法，是在豬舍內放土壤，任豬吞食。土壤內含有多量的鐵、銅，尤以紅色土的鐵銅含量最為豐富，所以在小豬出生三至五天後，將土壤放置豬舍內一角，任乳豬吞食即可。或注射「菌葡萄聚糖鐵」一至二立方公分於肌肉內，或於母豬乳頭塗鐵銅糖漿給乳豬吞食，都可以防止乳豬貧血的發生。

土壤是隨時隨地可以得到的材料，不但可以預防貧血，也可以防止乳豬白痢的發生，並有促進發育生長的效果，經濟有利，各位農友不妨試試看。但所用土壤，必須清潔，不得含有寄生蟲卵或其他病原細菌，因此，以較深處的壤土或紅色土壤為佳。

電氣若有故障時
千萬囑通加治試


小國
顧田
圖文



，新維名友農察頂
，真認（很）真事做新維
，珍阿叫（子老）真因新維
。根添名于生珍阿



，富正真來本新維
，層大（住）層人三子（老）某
，有項項氣電內層
。舊真線電是但



，慎緊要險危氣電
，新換要舊若線電
，因火起信不新維
。根添于死燒險險