


開路生防治紅蜘蛛四磅裝美國原裝



臺灣總代理青島貿易有限公司臺北市中正路一七五號三樓說明書附郵八角即寄

春季柑園

應該注意的六件事

王兆全

春天是柑桔開始發育的時候，同時也是新的管理工作的開始。為提高收益，這個時期的柑桔園，要注意下列幾個事項：

剪除新芽

柑桔在三至五月間發生新芽最多，如果在去冬修剪很重的話，春天發芽更多，所以須把生在主枝下部的新芽全部剪除（圖一）。
幼齡樹為要造成將來的主枝，需酌留一部芽。
同時，在亞主枝上生長太密的芽，也要剪除一部份（圖二）。
主幹上生出的芽也要剪除（圖三）。
還有枝的頂端，由複芽所生出的多個枝，看枝的強弱，剪除弱者一、二枝（圖四）。

新生枝條最容易生蚜蟲，所以要及時剪除。

春季施肥

二至五月，是柑桔枝葉生長最盛的時期，同時也是柑桔樹本身最需要肥份的時候，所以在這個時間，行春

細根直接有吸肥能力，所以應在樹的四周細根分佈最多處，開一圓形溝，把肥料埋入。

天乾灌水

本省南部二至四月間，天氣非常乾燥，同時還有乾風，不但土面水份

季施肥人為最適宜。施肥量要比秋冬兩季多些。

容易蒸發，非常乾燥，且幼果表皮，易被熱風吹傷，所以，此時要時常灌水，經常保持園地濕氣。


播種綠肥

覆蓋和綠肥，有增進土壤肥份的效能，柑園中不可缺少。

柑園春播綠肥，以「山珠兒豆」和「熱帶葛藤」較好。

防蟲防病


春季柑桔園中，蚜蟲、潛葉蛾幼




圖一：剪除主枝下部新芽



圖二：剪除亞主枝上過密的芽



圖三：剪除主幹上的芽



圖四：剪除弱小叢生芽枝

兔子

宰殺

剥皮

和

——造運陳——

本省飼養的兔子，多是皮毛兼用的改良種，所以，我們在殺兔的時候要想到：除了要吃牠們的肉外，還要利用牠們的皮和毛。上一期，我們曾介紹宰殺的方法，下面是剥皮的工作：

剥皮

剥皮的工作，是緊接宰殺而行的。剥皮的方法很多，各有長短利弊，不過，總是要使所剥下來的皮是完整的，潔淨

的。我想在這裡介紹一種簡單而能得完整兔皮的方法。







①宰殺後血液流盡之後，將四肢在關節之上切去，然後使兔身側臥，左手將兔隻左後肢拉開，以右手持刀，從左肢經過肛門而到右肢切開（只切皮而不切肉）。（圖一）

②切斷肛門的肌肉，用刀慢慢小心的往背部剥去到兩隻大腿完全切離皮毛為止（圖三）。途中經過尾巴的時候，同時切去尾骨，但切勿傷及尾皮（圖二）。

③將兩隻後肢拔出，脫離皮毛（圖四）。

④右手握住腰部，左手握緊已剥好的皮，慢慢的往後拉，到前二肢露出為止（圖五）。

⑤最後只剩下頭部，慢慢剥到耳部時，再用刀從耳根處切掉，最後將眼部口部切離（圖六）。到此便大功告成了。



蟲、鳳蝶幼蟲、介殼蟲等發生最厲害，每隔一至二週噴「馬拉松」乳劑八百至一千倍稀釋液一次。

「晚命夏」甜橙潰瘍病，要在此時花前花後坐果期噴二二一五〇式或三一三一五〇式「波爾多液」加以防治。

星天牛在五月初開始為害，預先準備「地特靈」，到時用四十五至五十倍稀釋液噴佈或塗抹枝幹。

中耕除草

柑園春天中耕，主要目的為除草，中耕時不要太傷根部，不可犁到柑樹附近，要將犁頭提起，輕淺滑過。巡視排水溝，如果雜草生得太多，趕快清除通暢。淤塞或破漏，都要在雨季未來前修好。

米米米米米米米米米米

桐油餅

可做果樹肥料，但使用油餅磨細加水經發酵後施用，併與化學肥料配合使用為宜。（吳）

雜草

「木風草」，日本名為「ヒゲリユ」，當土壤中水份達到百分之九十以上時才適合生長，所以，採用輪作栽培時，可以減少這類雜草的生長。二・四・D對「木風草」有效果。（誠）

雲南大頭菜

的幼苗和中苗耐高溫度力較強，中苗以後耐高溫度力極弱。因高溫度感受軟腐病外葉逐漸變黃枯死，無適當藥品可防治，唯一預防的方法，是延遲播種。（李）