

兔子的

宰殺

和剥皮

——造運陳——

本省飼養的兔子，多是皮毛兼用的改良種，所以，我們在殺兔的時候要想到：除了要吃牠們的肉外，還要利用牠們的皮和毛。上一期，我們曾介紹宰殺的方法，下面是剥皮的工作：

剥皮

剥皮的工作，是緊接宰殺而行的。剥皮的方法很多，各有長短利弊，不過，總是要使所剥下來的皮是完整的，潔淨的。

我想在這裡介紹一種簡單而能得完整兔皮的方法。


①宰殺後血液流盡之後，將四肢在關節之上切去，然後使兔身側臥，左手將兔隻左後肢拉開，以右手持刀，從左肢經過肛門而到右肢切開（只切皮而不切肉）。（圖一）

②切斷肛門的肌肉，用刀慢慢小心的往背部剥去到兩隻大腿完全切離皮毛為止（圖三）。途中經過尾巴的時候，同時切去尾骨，但切勿傷及尾皮（圖二）。

③將兩隻後肢拔出，脫離皮毛（圖四）。

④右手握住腰部，左手握緊已剥好的皮，慢慢的往後拉，到前二肢露出為止（圖五）。

⑤最後只剩下頭部，慢慢剥到耳部時，再用刀從耳根處切掉，最後將眼部口部切離（圖六）。到此便大功告成了。



蟲、鳳蝶幼蟲、介殼蟲等發生最厲害，每隔一至二週噴「馬拉松」乳劑八百至一千倍稀釋液一次。

「晚命夏」甜橙潰瘍病，要在此時花前花後坐果期噴二二一五〇式或三一三一五〇式「波爾多液」加以防治。

星天牛在五月初開始為害，預先準備「地特靈」，到時用四十五至五十倍稀釋液噴佈或塗抹枝幹。

中耕除草

柑園春天中耕，主要目的為除草，中耕時不要太傷根部，不可犁到柑樹附近，要將犁頭提起，輕淺滑過。巡視排水溝，如果雜草生得太多，趕快清除通暢。淤塞或破漏，都要在雨季未來前修好。

米米米米米米米米米米

桐油餅

可做果樹肥料，但使用油餅磨細加水經發酵後施用，併與化學肥料配合使用為宜。（吳）

雜草

「木風草」，日本名為「ヒゲリユ」，當土壤中水份達到百分之九十以上時才適合生長，所以，採用輪作栽培時，可以減少這類雜草的生長。二・四・D對「木風草」有效果。（誠）

雲南大頭菜

的幼苗和中苗耐高溫度力較強，中苗以後耐高溫度力極弱。因高溫度感受軟腐病外葉逐漸變黃枯死，無適當藥品可防治，唯一預防的方法，是延遲播種。（李）