

# 農友經驗

## 種植甘藷之前，宜施稻草烏肥！

利用二期作水稻收割後的土地種甘藷，最好在作畦以前先犁溝，將稻草放在溝裡，並施下烏肥（氮磷化鈣），再作畦種植。這樣在甘藷成活後，因有足量肥分，莖葉生長旺盛，請塊產量很高，且到收穫時，稻草都酸腐爛變為肥糞，增加土壤的有機質。（嘉義縣竹崎鄉龍山村水尾仔二號許旭明）

## 設置秧田，慎選地點！

秧苗強健與否，對稻作生育影響很大。據我數年來的實際經驗，秧田的選擇，又對秧苗育成很有關係。現在將

我選擇秧田的經驗發表，請各位指教。

第一期作因播種期恰為乾旱期，地下水位很低，土壤乾燥，又因寒冷期，每有降霜，所以必需選擇較濕的土地作秧田。又因天氣寒冷，必需有防風的設備，生育才會良好。

第二期作的氣候恰和一期作相反，此時氣溫高，雨水多，地下水位很高，所以必需選擇地下水較低，地上水位較低，排水較快，排水容易的土地作為秧田。



菇香的成功栽培地

## 我在平地栽培香菇

近年來，我在海拔五百至八百公尺山地南庄白冷泰安鄉等山地試種香菇，「菌絲」都發育良好，但因管理不週，產量並不很好。

因此，我又努力培育可在平地栽種的香菇品種，直至前年五月，在本鄉平地試作，獲得成功。

所用的樹種，「楓樹」、「水流柯」等，都是便宜而到處都有的雜木。目前，本鄉正在積極研究中，如能成功，將來推廣為農家副業，當可增加農村收入，改善農村的生活（苗栗縣公館鄉公所劉和興）。

## 信用唯一最誠實最可靠種子專家

### 嘉 義 清河精選優良種子

- 梅花松羅荷子(梅花卷)
- 清和改良大白花蘿蔔子
- 正隆生白葉白骨片菜子
- 青皮白胡胡瓜子(白瓜)
- 白花軟莢荷蘭豆
- 蘇中九號大莢荷蘭豆
- 蘇魯矮性木瓜子
- 富洲西瓜子
- 海洲西瓜子
- 金瓜子(小瓜型)
- 日本四葉胡瓜子
- 大號先施韭菜子
- 美國大五寸人蔘子(胡蘿蔔)
- 美國加州大粒甜椒子
- 美國加州大粒甜椒子
- 日本新二代大粒甜椒子
- 美國大心高豆
- 荊芥子(京芥)
- 日本新理想晚稔(耐熱抗病力強早晚通用)
- 日本東湖晚稔菜子
- 日本長岡一號甘藍菜子
- 日本長岡二號甘藍菜子
- 日本長岡福壽二號トマト
- 日本長岡福壽大號トマト
- 日本開花非菜子
- 全日本野川牛蒡子
- 虎耳荷葉菜子
- 苦草子(粗米)
- 千草子(粉粉)
- 胭脂長茄子
- 特選理想樹子
- 蘋果型トマト
- 青江白菜子
- 益農素(促進發育健根健體增加收量)
- 富研西瓜子
- 一條根白菜子
- 大號應菜子(空心菜)
- 尖葉小號應菜子(空心菜)
- 紅仁白格二尺半長菜子
- 臺中種產紅仁白格白豆
- 日本ニールン子
- 新製梨仔瓜子
- 北京劍葉結頭菜子
- 早春の天白心白菜子

## 清河種子行

嘉義市中正路四八二號 電話三五八四號  
劃撥儲金嘉字八〇〇三七號

政府檢驗



合格農藥

## 世界名廠出品優良農藥總經銷

- 樂農家：瓜類、豆類、蔬菜：銹病、露菌病、炭疽病。
- 殺也特：薄荷、瓜類：白粒病、柑桔：象皮病(銹痺)。
- 鐵地旺：柑桔、荷樹、棉花、蔬菜、紅蜘蛛。
- 美寶粉：最新全能殺菌劑、替代波爾多液、省力、省時、省錢。
- Ekatox：含巴拉松50%乳劑、功效優於巴拉松(富粒多)

## 興農化學工廠有限公司

臺中縣大里鄉內新村內新路五九號  
電話：臺中市 2619、4688  
信箱：臺中郵局第 236 號  
臺北連絡處：臺北市仁愛路二段46號  
電話：38826