

來信請用明信片
寫真實姓名住址
信正面註「農問」
信中免寫客氣話

乳羊乳房發生硬塊

是擠乳不完全之故



【問】：敝人所飼母乳羊，已生第二胎。平時因疏於擠乳，致使乳房發生硬塊，不知用什麼方法可使硬塊消失。（臺東瑞源鳳梨農場主訓）

【答】：乳羊之乳房變成硬塊，是因為擠乳不完全，引起發炎，沒有治療，即變成硬塊了。已經結塊後，無法再使牠軟化。以後要注意，如果有發炎現象，即用熱水熱敷，或用地盤素軟膏，由乳頭乳管擠入可消炎。處理時要消毒，同時要小心，要弄破乳頭，獸醫藥物店有專門出售這種治療用軟膏的。（李登元）

仔豬離乳前發育不良

應多補充蛋白質飼料



【問】：一、仔豬離乳前，管理不善，致使（發育不良）應如何飼養？
二、有沒有牛乳的殺菌藥劑？
三、市售乳酸菌製劑，與金釐素和ベニリン，有無抗拮作用？可以混合使用嗎？（臺北市大理街十一號陳郁）

【答】：一、離乳前發育不良，斷乳後飼料中多給些動物性蛋白質補充飼料，如脫脂奶粉、魚粉等，給與量可佔總飼料的百分之十。

二、牛乳只有以高溫或低溫殺菌，而不用殺菌藥劑。高溫殺菌後，裝罐密封，可保存數月。
三、乳酸菌製劑沒有拮抗作用，可以混合的。（李登元）

仔豬斷乳前一星期

預防注射最為安全



【問】：小豬受預防豬瘟丹毒注射後，經過五天至六天，食慾減退，眼睛發紅，泌出粘膿性分泌物，便秘，體溫已經四十一度以上，雖請獸醫治療也沒有效果。這是什麼原因？


受過預防注射的小豬，要怎樣管理，即會避免？（臺南縣後壁鄉福安村九號翁春秋）
【答】：小豬預防注射後引起的疾病，請報請臺南縣政府家畜疾病診療所查明，並作有效措施。

按來信情形推察，可能這樣的豬隻，在預防注射接受前，已經傳染豬瘟病毒，但尚未發病。雖然經過預防注射，但是免疫效力的發生，來不及防止發病。

小豬的預防注射，最好在斷乳日期前一星期，即出生後四二天至五十天之間，最安全可靠。因此購買小豬時，應該注意，所購之小豬，有無經過確實的預防注射。如果不得已購得未經預防注射之小豬，應十二分的注意，隔離飼養二星期，確認健康後，請貴地獸醫師實施預防注射，比較妥當。（劉永和）

台農牌

養雞完全配合飼料



本會承蒙農復會補助現代化飼料機器設備
全套暨撥發飼料生產營運資金設廠生產配製成分品質優良價格公道「臺農牌」完全配合飼料具有下列

特點：

1. 新式工廠設備，生產能力月產1,000公噸（每日工作八小時計算）
2. 原料新鮮成分檢驗正確
3. 配方特色成分絕對保證
4. 包裝安全，重量確實
5. 配合供運銷連鎖制度



臺灣省農會飼料供應中心

連絡處：臺北市中正路1400巷102號
電話：32249 32036

請各位會員逕向當地農會訂購