

銀合歡青種子夾含毒素

切碎煮熟過濾可以餵豬

【問】：銀合歡未成熟之青種子夾，不知是否有毒？可直接使用或煮熟後與「米水」等混合飼養否？（屏東縣恒春鎮龜角路五號 林昭宏）

【答】：銀合歡之毒素全株均有，但在幼嫩莖葉及種子中含量較高。青種子夾也含有少量毒素。如切碎煮熟，將水濾去後，可以餵豬。（黃繁）

家禽孵化溫度

中止卵致死原因



【問】：一、請問人工孵卵對於雞、鴨、鵝、公雞、鵝子等之正常孵化溫度應以多少為宜？

二、請問「中止卵」（胚胎中間死亡）與正常卵同一環境，然其致死原因何在？是否與受精有關？或母體之健康有關？（雲林縣水林鄉葛松原路區李卓勳）

【答】：一、人工孵卵，立體孵化器，雞、鴨、鵝、火雞等一樣，為華氏一〇〇度，鵝則須一〇二度。若相差二至三度，三至四小時，即有致胚胎之死亡。平面孵化器雞、鴨、鵝、火雞等一樣為華氏一〇二至一〇三度，鵝則須華氏一〇四度。

二、在孵化管理不善時，可能有中止卵。若孵化正常，則多由於先天性遺傳致死因子之關係，以及母體營養缺乏；尤其是缺乏維他命B₁₂，可以使它中途死亡。（李登元）

開雞工具那裡有賣？

【問】：開雞的工具（開雞架、小刀、攪蛋器、鉤、去蛋鉗等）及雞的腳趾間打洞器（腳趾間打一個小洞做記號用），何處有出售？（高雄縣內門鄉木柵村中新巷三六號翁士城）

【答】：開雞的工具，及雞腳趾打洞器，請函臺南市衛國街五號臺南種雞園洽購。（李登元）

柑桔防蟲主根修剪法



【問】：貴刊十一卷廿三期十一頁柑桔防蟲一文，第二法所述修剪主根一節，請問：（一）應剪去多少？（二）剪後，其切口應否抹什麼藥，或作其他什麼安全（防病害）處理？（三）假植與定植之剪法是否一樣？（四）晚間西亞枯苗是否適於用此法？（五）對以後之產量是否有影響？（臺東縣東河鄉北源七一三號時澤臣）

【答】：（一）主根剪除，應視細根多寡而定。細根多，可剪除主根四分之一。如細根很少，祇能稍剪主根尖端。過份剪去，恐影響生育。

（二）主根剪後，應即用「烏斯普龍」八〇〇至一〇〇〇倍塗抹，以免腐爛。

（三）如假植已剪除主根，則定植不必再剪。

（四）晚間西亞橙可用此法。

（五）如果管理周到，絕不影響將來產量。（嚴夢如）

大豆施肥

應在開花前



【問】：我種植的百美豆，有五十天了，現在正開花結莢，如今再施肥或噴射植物荷爾蒙，是否有益？或是有害？（屏東縣長治鄉新潭村一八號邱安仁）

【答】：種植百美豆（其他大豆品種亦同），施肥或噴射荷爾蒙時期，以開花前為宜。

至開花結莢時期，如再施肥或噴射荷爾蒙，不但無益，反而有害。（劉文慶）



低毒性農藥

對人畜無害

最新強力殺蟲劑

可安心使用

地特松80%水溶粉劑

Dipteryx
S.R. 80

特點

ダイブテレックス（日名）

1. 對人畜毒性極低，祇有巴拉松之 $1/200$ ，可安心使用。
2. 殺蟲力及滲透力強烈，可溶解於水對螟蟲殺效同於巴拉松。
3. 適用範圍甚廣，對果樹，大豆，蔬菜等之害蟲殺滅。有優越之效果。
4. 對農作物不發生藥害。



臺灣總代理：中德貿易有限公司

臺北市博愛路九八號

現貨供應處：正豐化學股份有限公司

臺中縣霧峰