

防治大豆斜紋夜盜蟲

可用賽文可濕性粉劑



爲害甚大，要怎樣來防治。(屏東縣萬壽鄉酒溝村永平路四十六號林清善)

【答】：一、大豆播種後，田間雜草稻草燃燒，既可增加鉀肥，又可燒死病菌和害蟲；同時田間的雜草，長得比較少，因此大豆發育比較良好。

二、斜紋夜盜蟲，爲害大豆，以幼蟲爲害最烈。幼蟲白天匿於土中，夜間出來爲害，噴藥防治時間，最好是在日落後或夜間。大豆結莢後，發生斜紋夜盜蟲，可噴射「賽文」可濕性粉劑八百倍，或四十七倍「大滅速」乳劑一千倍，或五十分「速滅松」乳劑一千倍稀釋液。(劉文慶)

甲基丁香 油香處

【問】：(一)誘殺果蠅之含毒「甲基丁香油」何處可買到？(二)「甲基丁香油」本身含有毒素嗎？(花蓮市五福街二十號林敬夫)

【答】：(一)含毒「甲基丁香油」，可在就近之農藥行，或向新竹青果合作社買得。

(二)「甲基丁香油」本身不含毒。(劉和元)

噴霧器用過應即洗淨

噴霧器用過應即洗淨

【問】：一、大豆播種後，隨即覆草燃燒的，發育比較良好，是什麼原因？

二、大豆結莢後，發生「斜紋」夜盜蟲，爲害甚大，要怎樣來防治。(屏東縣萬壽鄉酒溝村永平路四十六號林清善)

果樹施用牛糞方法

【問】：果樹施用牛糞之正確方法爲何？(九龍彌敦道三六九號阮甘泉)

【答】：果樹四週施下牛糞之前，先挖淺溝，施下牛糞之後，用土壟覆蓋，如此可增加施肥功效。牛糞之中若有多量稻草時，宜先堆積，使之腐熟後施用。(吳啓東)



殺菌劑與殺蟲劑

各有用途不要混用

農業主要可分二大類，殺蟲劑及殺菌劑。殺菌劑是防治病害的，且多着重於事先之預防，使病菌不得侵入寄主植物。殺蟲劑則是防治害蟲的，對害蟲有胃毒、觸殺及熏蒸等作用。所以除了極少數兼具殺蟲及殺菌兼用藥劑外，殺蟲劑及殺菌劑不可混用。事實上往往有些農友會誤用，現在把常用的殺菌劑、殺蟲劑、殺菌(紅蜘蛛)劑及殺蟲殺菌劑略述於後。

一、殺菌劑：①愛樂生，②阿蘇仁，③西樂生，④大生二二，⑤大生七八，⑥富米農片劑，⑦谷樂生，⑧可利生，⑨好速殺七五，⑩福爾丹，⑪賜保根，⑫多德，⑬烏斯普龍。

二、殺蟲劑：①阿特靈，②BHC，③大利農，④地特靈，⑤安特靈(禁止用於蔬菜方面)，⑥大滅速，⑦益加津，⑧馬拉松，⑨巴拉松，⑩飛佛達，⑪靈丹，⑫滅他悉死脫，⑬溴化甲烷，⑭富賜靈，⑮賽文，⑯蠅敵死，⑰DDT，⑱依必安，⑲夏油，⑳魚藤精。

三、殺菌(紅蜘蛛)：①克氣笨，②開路生，③鐵地旺。

四、殺菌兼殺蟲劑：①波爾多液，②石灰硫磺合劑，③硫磺粉。(朱啓魯)

一致養雞·豬·鴨的各農家的好消息——

防治貴家禽畜疾病、把牠們 餵肥養大、增產優良的蛋·肉

這就是增加貴家收入唯一的近路！


費用僅小，用法簡便——ロメジンソーダ與ベキシン只要溶於禽畜的飲料水或混入飼料中就可達成目的。請立刻試用。

最新禽畜驅蟲藥

預防/治療，雞病的特效藥

動物用

動物用




禽畜也和人一般，體內若有蛔蟲寄生，決不能肥大。請把ベキシン每月一次定期的給貴家禽畜吃而看牠們一天比一天的肥大。

【包裝】 30公分，100公分，500公分，

對家雞患染的一切疾病有顯著優秀的功效。雞在雞時尤易染病，這時期給與ロメジンソーダ，預防的效果更大

【包裝】 50公分，100公分，100片盒



田辺製薬

全島有名藥店發售