


治防樣怎

炎膜內宮子的猪母



宣欽游

體型良好繁殖力又強的母猪，也會因飼養管理上的疏忽而染患子宮內膜炎，失去繼續飼養的價值，請養母猪的農友們多多注意！
改善飼養管理的方法，可以有效預防本病。發病後，可用抗生素藥劑治療。

母猪的子宮內膜炎，主要是在母猪分娩時產道粘膜炎，由「連鎖球菌」、「葡萄球菌」、「大腸菌」等侵入傷口而感染發生的。發生原因，約有下列五種：

發生的原因

- (1) 初產母猪或過肥母猪，產道骨盤狹小，外陰部過小，以致分娩時發生裂傷。
- (2) 胎兒過大不正常，以致分娩時傷害產道。
- (3) 陣痛微弱，發生難產，用手插入助產而發生。

- (4) 流產後沒有消毒產道，或消毒不完全。
- (5) 種公猪生殖器帶有細菌，經交配而傳染給母猪。

主要的病狀

分娩後第一日流出紅色液。第二日變成黃白色粘性，且含有臭氣的膿液，約持續三至四日。
正常母猪也在分娩後三至四日間排出液體，但是是白色，沒有粘性，也沒有臭氣，所以，很容易和子宮內膜炎區別。
染患子宮內膜炎的母猪，會引起發情微弱或不定期發情（亂發情）的現象，有時也會停止發情，因此，雖經多次配種，也難於受孕。嚴重時不喜歡運動，時常臥睡，致脂肪沈着，和肥猪一樣。

預防的方法

- (1) 避免過早配種：年齡較小（生後六至八個月）的母猪，生殖器官未完全成熟，骨盤小，產道小，不可供繁殖之用。所以，必須等到生殖器官成熟（約生後九個月以上並發育完全時），方可開始配種。
- (2) 多給青飼料並使充分運動：飼養母猪，必須注意防止過肥，尤其是育成中或懷孕前半期（配種後二個月），必須多給青飼料（牧草、甘藷、青菜類等），並使充分運動晒太阳，俾使骨盤開闊，順利生產仔猪。
- 如果分娩時陣痛微弱，須注射「腦下垂體前葉荷爾蒙」或「麥角製劑」促進陣痛，使骨盤開闊容易生產。
- (3) 防止流產：懷孕母猪放出運動時，必須防止互相爭鬪。冬天必須有防寒的設備，不可給與過冷的飼料。
- 夏天天氣悶熱時，須防止熱射病或日射病；就是說，猪舍內要涼爽，並時常保持清潔乾



，錢騙來神騙醫假
，是就伊佛活稱自稱通
，如不人犯前通
。女婦的家良騙專



，起不了街醫醫神
，醫能却病怪種各
，利便真房護專
。疑無擺女信男善



，做景好地山東屏
，寺××字廟建新
，市利真火香衆近
。醫神一了衆爲因

這終育才當不
專騙良家的婦女
小阿
顧山
圖文

燥。

治療的方法

如果母豬流產，須用「配尼西林」二支和開水一千至一千五百立方公分(cc)洗滌產道，並注射「配尼西林」一百三十萬單位四至五日。陰部裂傷，則用二%「來蘇液」清拭，並連用至痊癒為止。

塗佈「紅藥水」一日二次，或塗「配尼西林軟膏」。

子宮內膜炎則用「配尼西林」「鏈黴素」(康必安)一支，混合「磺胺劑」二十立方公分(cc)，蒸餾水二十至六十立方公分(cc)，用人工授精注入器注入子宮內，每天一次，連用至痊癒為止。



早生 晚生 甘藍 骨 娃

按照本省的習慣，所謂甘藍品種的早晚生，是根據栽培時期早晚來決定的。

但是在美國和日本，早晚生則指生育日數的長短；生育日數為六十日即為早生，七十五日為中生，八十五日為晚生。

一般說來，本省甘藍栽培時期，可分為早期栽培、中期栽培(十月中旬以後)、晚作栽培和夏季高冷地栽培四種；適宜早期栽培的品種叫早生甘藍，適宜秋季或晚作栽培的品種叫晚生甘藍。

適宜早期栽培的早生甘藍生育日數長(約七十五天)，耐熱，但在低溫下容易抽苔，不適宜秋季或晚作栽培。

「三池中生」、「成功」和「長岡交配一號」三個品種的特性，是大致相同的；因為「三池中生」由「成功」分離育成；「長岡交配一號」是由「成功」純系作為兩親之一而交配出來的第一代雜種。

棉花

棉花落花落鈴，有正常脫落和不正常脫落的原因，有病蟲和人畜傷害、乾旱、積水等。防治方法：①良好的病蟲害防治，②注意田間排水和適當的灌溉，③田間管理操作不要傷害棉株和棉根。

鐘鈴

在香蕉行間間作棉花，棉株受香蕉蔭蔽，棉株徒長，田間通風透光很差，株間濕度高，因而容易落鈴。

鐘鈴

蟲害防治不得法，沒有將為害花鈴的金鋼鑽和紅鈴蟲治好，花鈴也會脫落。棉花萌芽裂開後，隨時可以採收，一般棉田普通為一星期採收一次，但如人工調配不均，或環境不容許，也可延長或縮短間隔天數。(熊光斗)

「長岡交配一號」和「三池中生」的種子，本省種子店多有出售。

為發展冬季蔬菜外銷，今後最好選種在冬季不抽苔的早生品種(生育日數五十五至六十日)，而且每球不超過三臺斤(最好二臺斤左右)，但應勵行密植，以提高單位面積產量。



，味滋知了食佛假
，女婦五污積連
，去出傳聲風來後
。院法送捉來察警



，理天無人害佛假
，死半氣身失女少
，琴名名的已自着為
。去出傳張聲敢不



，娥阿治女少家吳
，寺××到來醫米
，伊編衆符用佛假
。戲巴雙房病夜半