

# 我種一葉蘭的經驗

·寬永郭·

「一葉蘭」是本省高山野生的蘭花，但是在世界上却很有名。這幾年來、美國、日本、英國等，都在本省搜集「一葉蘭」球根，運返栽培欣賞。去年，臺北一位有名的愛蘭專家，搜集「一葉蘭」球根，輸往日本，銷售十餘萬個，且供不應求。

可是野生「一葉蘭」球根有限，如果今後不以人工培養繁殖，不久之後，這名貴的蘭種必將逐漸絕跡了。你對「一葉蘭」栽培有興趣嗎？請聽本文作者的經驗談，因為他栽培「一葉蘭」，已有二十多年的歷史。

「一葉蘭」產生於高山溫帶，本省花蓮、阿里山等地都有。海拔二千公尺以上的山地，斜度四十五度以上的岩壁，大樹遮陰潮濕的地方，到處都可以生長。

## 一葉一花·唇瓣白色

「一葉蘭」一葉一花，唇瓣白色，內瓣有紫斑，花季溫帶區三、四月，暖、熱帶二、三月，開花時有花無葉，多年生，高約二十至三十公分。球根和薤球一樣大小，下圓上尖，呈青紫帶稍黑樹色。

每年更新球根一次，老球根到冬天凋謝，新球根繼續成長繁殖。天然的球根，多是一芽一花，人工培養的一至二花。花梗長八至十分，花瓣長四至五公分，花期約二週至三週。

## 陶製花盆·水苔栽培

準備陶製花盆、蛇木盆或蛇木板。花盆內緣以一至二寸深最為適宜。盆底要有排水孔一至二個。六寸直徑的淺型盆，可植球根十個。準備水苔若干。

栽植時期有二季，冬季至春前，或開花後即宜，如一月上旬至二月上旬之間。

距離是二寸四方排置球根一個，上面覆蓋乾燥的水苔，厚度以球根露出水苔上一至二寸高為宜，然後輕輕澆水，保持濕度（不用任何土壤，否則球根將腐爛）。

至葉芽或花芽萌出期間，時常要保持適當的濕度。如每日氣溫在十八至二十二度之間，可望在初春開花。

## 注意通風·當日曬

開花之前，不可施用任何肥料，只以清潔冷水澆噴就夠了。花謝後，隨即萌出一嫩葉，逐漸



告 廣 薦 推 年

### 低 毒 性 農 藥

### 對 人 畜 無 害

### 最 新 強 力 殺 蟲 劑

### 可 安 心 使 用

### 地 特 松 80% 水 溶 粉 劑



ダイブテラックス (日名)

### 特 點

1. 對人畜毒性極低，祇有巴拉松之 1/200，可安心使用。
2. 殺蟲力及滲透力強烈，可溶解於水對螟蟲殺效同於巴拉松。
3. 適用範圍甚廣，對果樹，大豆，蔬菜等之害蟲殺滅。有優越之效果。
4. 對農作物不發生藥害。



臺灣總代理：中德貿易有限公司

臺北市博愛路九八號

現貨供應處：正豐化學股份有限公司

臺中縣霧峰

成長。之後，要看盆內水分多少，逐漸增加澆水次數。水多無害，過乾可能枯死。澆水必須在早晚舉行。

「一葉蘭」喜愛通風良好的場所。夏季氣候炎熱，應將花盆置於房屋西北方屋檐下或陰棚下培養。

如果放置場所所有困難時，每天只需照射早上的陽光三小時就足够了。

夏季太陽強烈時，在上午十時以後至下午黃昏之間，可不必照射陽光，否則葉梗必被太陽燒焦，早期落葉，球根不熱，第二年就不再開花了。

「一葉蘭」的肥料，可以用胡麻餅粉末浸水，經腐熟後施用上澄液。

胡麻餅液肥的作法如下：研細的胡麻餅一公升，以清水十公升浸漬，



蘭葉一的養培工人

在十八至二十二度的氣溫下經三個月後，將上澄液倒出，加清水十倍後即可施用。

施肥必需在黃昏前舉行，施於株與株之間即可。如果十株球根為一盆，每次施三十至五十公分，每十日施給一次。

施液肥的期間，自三月中旬至五月底止。六月至八月底，則直接以胡麻餅粉末施給。用吃冰用的小匙，每株間施二匙，每月施給二次。

**拔除老根·繁殖新根**

這樣培養管理，發育都會很好。到六月底，新芽的球根就長到和舊球根一樣粗大了。九月上旬，必須先將今年種的老球根拔除，以促進新球根的生長。

此時在新球根下方一邊，看出萌出的白色花芽一至二個，為促進這些花芽發育，須將覆蓋在上面的水苔移開，使花芽能照到陽光。

十月上旬，將覆蓋在新球根上面的水苔移開，使球根露出，照射太陽，以促進球根肥大。

到了十月底至十一月上旬之間，「一葉蘭」的新球根已完全成熟，葉梗變黃而枯萎落葉。看到這個情形，就把球根拔取，去腐已經枯萎的老根和葉梗，用清水洗滌一次，然後在陽光下曝曬一小時，除去水份並殺死細菌。

曝曬過的球根，放入桶內，加八百倍「烏斯普龍」液，消毒二十分鐘，然後放置於淺底木箱中，一層層排列，貯藏於陰暗的場所，等到明春再予種植。

世界上到目前為止只有這一種奇妙的家畜驅蟲劑

西德拜耳大藥廠出品

農友之友 **元山公司獨總經銷**

小包裝全省普銷!!!

西藥行 各地飼料行均售 農藥行

每包新臺幣

10元正

可以殺滅



**牛猪安**  
ネグヴン

- 1 牛壁蝨
- 2 猪羊毛虱
- 3 牛馬胃蠅
- 4 猪蛔蟲
- 5 猪鞭蟲
- 6 疥癬蟲
- 7 吸血毒蚊
- 8 鹿蠅