

成長。之後，要看盆內水分多少，逐漸增加澆水次數。水多無害，過乾可能枯死。澆水必須在早晚舉行。


「一葉蘭」喜愛通風良好的場所。夏季氣候炎熱，應將花盆置於房屋西北方屋檐下或陰棚下培養。

如果放置場所所有困難時，每天只需照射早上的陽光三小時就足够了。

夏季太陽強烈時，在上午十時以後至下午黃昏之間，可不必照射陽光，否則葉梗必被太陽燒焦，早期落葉，球根不熱，第二年就不再開花了。

「一葉蘭」的肥料，可以用胡麻餅粉末浸水，經腐熟後施用上澄液。

胡麻餅液肥的作法如下：研細的胡麻餅一公升，以清水十公升浸漬，



蘭葉一的養培工人

在十八至二十二度的氣溫下經三個月後，將上澄液倒出，加清水十倍後即可施用。

施肥必需在黃昏前舉行，施於株與株之間即可。如果十株球根為一盆，每次施三十至五十公分，每十日施給一次。

施液肥的期間，自三月中旬至五月底止。六月至八月底，則直接以胡麻餅粉末施給。用吃冰用的小匙，每株間施二匙，每月施給二次。

拔除老根·繁殖新根

這樣培養管理，發育都會很好。到六月底，新芽的球根就長到和舊球根一樣粗大了。九月上旬，必須先將今年種的老球根拔除，以促進新球根的生長。

此時在新球根下方一邊，看出萌出的白色花芽一至二個，為促進這些花芽發育，須將覆蓋在上面的水苔移開，使花芽能照到陽光。

十月上旬，將覆蓋在新球根上面的水苔移開，使球根露出，照射太陽，以促進球根肥大。

到了十月底至十一月上旬之間，「一葉蘭」的新球根已完全成熟，葉梗變黃而枯萎落葉。看到這個情形，就把球根拔取，去除已經枯萎的老根和葉梗，用清水洗滌一次，然後在陽光下曝曬一小時，除去水份並殺死細菌。

曝曬過的球根，放入桶內，加八百倍「烏斯普龍」液，消毒二十分鐘，然後放置於淺底木箱中，一層層排列，貯藏於陰暗的場所，等到明春再予種植。

世界上到目前為止只有這一種奇妙的家畜驅蟲劑

西德拜耳大藥廠出品

農友之友 **元山公司獨總經銷**

小包裝全省普銷!!!

西藥行 各地飼料行均售 農藥行

每包新臺幣

10元正

可以殺滅



牛猪安
ネグヴン

- 1 牛壁蝨
- 2 猪羊毛虱
- 3 牛馬胃蠅
- 4 猪蛔蟲
- 5 猪鞭蟲
- 6 疥癬蟲
- 7 吸血毒蚊
- 8 鹿蠅