


# ！痢白患猪乳心當



欣 聯 張

哺乳仔猪的白痢很普遍，多發生於二至四週齡的幼猪，發病原因複雜，不容易防止。病猪拉白色或白黃色稀糞，並發出一種惡臭，貧血瘦削，發育延遲，甚至衰弱死亡，養乳猪的應當心。

## 病 因

仔猪白痢不是傳染病，腸道內沒有特殊病原細菌，但病症較嚴重者，可由腸內分離溶血性大腸桿菌及嗜酸性乳酸菌。這些細菌，平常也存在於腸內，在普通情形下，並沒有什麼病原性，但在下列情況下，却可能變成有害的：  
**母猪飼養管理失宜** 突然變換母猪飼料，或給與發酵、發酸、酸敗的飼料，影響乳質，因而哺乳仔猪發生消化障礙，引起白痢。  
**猪舍環境不良** 猪舍內排水不良，如泥土

地面及水泥地面破爛，或傾斜度不够，猪舍沒有陽光照射，通風不良，舍內潮濕時都可能誘發白痢。

**氣候影響** 寒冷以及多雨季節，仔猪睡在寒冷潮濕的地面，腹部受冷，發生白痢。

**母猪患病** 母猪患病（如乳房炎、熱性病、子宮內膜炎、食物中毒以及下痢等）時，泌乳量減少，仔猪既食母猪飼料，引起消化障礙，以致發生白痢。

**營養不良** 仔猪體質脆弱，消化力差，營養不良，繼發白痢。

缺少青料、甲種維生素或礦物質（尤其鐵銅）時，也容易發生白痢。

總之，仔猪白痢發生原因很多，多種原因重複時，最容易發生，且病狀也比較嚴重。

## 病 狀

仔猪白痢多發生於二至四週齡的乳猪，以後隨猪齡增加而逐漸減少。

主要症狀為白色下痢便，並有一種汚臭味。輕者排白色軟便，重者白色粥狀便，嚴重者為白色或黃白色乃至不潔黃綠色水樣便，尾部污染糞便，背部彎曲，如疝痛狀，病急後重，皮膚乾燥，失去光澤，被毛粗剛，步伐強拘，離群震顫，或伏臥於褥草中，眼窩凹陷，結膜變白，食慾漸減，呈營養不良，瘦削貧血，陷於虛脫，終於死亡。


病狀輕者，有時自然轉好，可由白色軟便漸次轉為白色小糞塊，恢復治癒，但大部份應即時治療，否則以後發育必受影響。

## 治 療

治療仔猪白痢，多服用藥物，普通以磺胺藥類（如磺胺胍淨，磺胺美星，磺胺米拉淨等）為主，另加抗生素（如金徽素，土徽素，氣徽素）及其他消化劑、收斂劑等治療。

可用下述配方：

提倡麵食是最好  
將來糧食免煩惱



為寶是在實  
玩好提物好長春四  
(玩好)提物好長春四  
(讚稱)哇呵都家大熱  
。何奈將加增口人

何奈將加增口人  
討檢要題問食糧對好有  
。好最是食麵提倡

好紅波多  
。青，波多

