

應用劇毒農藥 注意人畜安全！

我們目前所用的農藥，有的有「劇毒」，應用時要特別小心。在這新年耕作即將開始的時候，我們再把「劇毒農藥」的種類，和應用時應注意的事項提出，請各位農友們提高警覺，保護人畜的安全。

那些是劇毒農藥？

究竟怎樣才算「劇毒農藥」？關於這個問題，本刊上一期的「農友新知」欄，曾經介紹過經濟部農業計劃聯繫組植物保護小組最近擬定的標準，下面是目前常用的幾種「劇毒農藥」：


- 一、弗拉倒，二、福賜靈，三、巴拉松，四、甲基巴拉松，五、依必安，六、固殺松，七、安特靈，八、安特靈，九、有機水銀劑 (EMO, EMP, PMA, EMTS)，十、滴滴微皮。

劇毒農藥安全用法

一、用藥前必須檢查噴霧器有無漏水，細讀農藥標貼及說明書。
二、倒原液時須用量杯，勿用瓶蓋，以免藥液沾着手上，原液倒入水

中須用竹棒攪拌，竹棒沾藥之一端勿與皮膚接觸。
三、勿任意減少農藥之加水倍數或任意多用藥，遵守用藥時期。
四、施藥時應穿帶手套、口罩、雨衣、長統雨鞋等，以免藥液沾着皮膚，勿逆風噴藥，身體不適時勿噴藥。
五、噴藥時間每人每天勿超過四小時，工作中勿吸煙喝水。
六、隨帶肥皂，萬一不慎皮膚觸及藥液，應立即用肥皂洗淨。
七、凡沾有藥液之用具、衣服、口罩、手套、雨鞋等，用過後應以肥皂水洗淨，噴藥後自己用肥皂洗淨全身、嗽口、休息、始可吸煙、飲水、吃飯。
八、噴藥時如感身體不適立刻去看醫生，緊急處理可用指壓喉或服多量鹽水，使吐出胃內毒物。

植物促進育生劑
效果確實
信用可靠
現貨供應



總經銷：
信承農產行
溪湖鎮平和里員鹿路66號




做行尚有中藥中之只蘇子生地種等歡迎照會

其它未刊載種子尚有歡迎照會，特效農藥東和牌噴霧器等歡迎光臨賜顧。

清河種子行

嘉義市中正路四八二號
電話：三五八四號
劃撥儲金嘉字八〇三七號



信用唯一誠實最可靠種子專家
嘉義 清河精選優良種子

- 早春35天包心白菜子
- 梅花松羅蘭子(梅花春)
- 清河改良大梅花羅蘭子
- 正晚生白菜白骨片菜子
- 青皮白刺胡瓜子(自瓜)
- 白花軟莢荷蘭豆
- 臺中九號大莢荷蘭豆
- 蘇魯矮性木瓜子
- 富岡西瓜子
- 海湖西瓜子
- 金瓜子(木瓜型)
- 大號究尾菲菜子
- 美國大五寸人參子
- (胡蘿蔔)
- 美國球型洋蔥子
- 美國大心萬苜
- 美國加州大粒甜椒子
- 荆芥子(京芥子)
- 日本新理想菠薐(耐熱抗病力強早晚通用)
- 日本東湖菠薐菜子
- 日本長岡一號甘藍菜子
- 日本長岡福壽二號トマト
- 日本長岡福壽大型トマト
- 日本龍野川牛蒡子
- 全年開花菲菜子
- 虎耳尚荷菜子
- 苦瓜子(粗米)
- 千草子(涼粉子)
- 胭脂長茄子
- 特選想思樹子
- 蘋果型トマト
- 清江白菜子
- 益農素(促進發育健根健)
- 橫增加收量)
- 日本四葉胡瓜子
- 富研西瓜子
- 一條根白菜子
- 大號應菜子(空心菜)
- 尖葉小號應菜子(空心菜)
- 紅仁白產二尺半長菜豆子
- 臺中種產紅仁白格目豆子
- 日本ニメロン子
- 新型梨仔瓜子
- 北京劍葉結頭菜子
- 50天短種羅蘭子(交春後可下種)
- 福特好285矮性皇帝豆子
- 日本タキイ照葉系美濃大根蘿蔔(舊曆二月中旬下種)
- 新夏秋35天包心白菜子
- 白花芥蘭子
- 80天油菜子
- 水上產青皮竹竿黃麻子
- 青皮竹竿黃麻子
- 紅皮黃麻子
- 棉葉古巴麻子