應用劇毒農藥　注意人畜安全！

我們目前所用的農藥，有的有「劇毒」，應用時要特別小心。在這新年耕作即將開始的時候，我們再把「劇毒農藥」的種類，和應用時應注意的事項提出，請各位農友們提高警覺，保護人畜的安全。

那些是劇毒農藥？

究竟怎樣才算是「劇毒農藥」？關於這一個問題，本刊上上一期的「農友新知」欄，曾經介紹過經濟部農業計劃聯繫組植物保護小組最近擬定的標準，下面是目前常用的幾種「劇毒農藥」：

一、弗拉倒，二、福賜靈，三、巴拉松，四、甲基巴拉松，五、依必安，六、固殺松，七、安特靈，八、安特靈，九、有機水銀劑（EMO, EMP PMA EMTS），十、滴滴微皮。

劇毒農藥安全用法

一、用藥前必須檢查噴霧器有無漏水，細讀農藥標貼及說明書。

二、倒原液時須用量杯，勿用瓶蓋，以免藥液沿着手上，原液倒入水中須用竹棒攪拌，竹棒沾藥之一端勿與皮膚接觸。

三、勿任意減少農藥之加水倍數或任意多用藥，遵守用藥時期。

四、施藥時應穿帶手套、口罩、雨衣、長統雨鞋等，以免藥液沾着皮膚，勿逆風噴藥，身體不適時勿噴藥。

五、噴藥時間每人每天勿超過四小時，工作中勿吸煙喝水。

六、隨帶肥皂，萬一不慎皮膚觸及藥液，應立即用肥皂洗淨。

七、凡沾有藥液之用具、衣服、口罩、手套、雨鞋等，用過後應以肥皂水洗淨，噴藥後自己用肥皂洗淨全身、嗽口、休息、始可吸煙、飲水、吃飯。

八、噴藥時如感身體不適立刻去看醫生，緊急處理可用指壓喉或服多量鹽水，使吐出胃內毒物。

植物促進育生劑

效果確實

信用可靠

現貨供應

2571

總經銷：

信承農產行

溪湖鎮平和里員鹿路66號

信用唯一誠實最可靠種子專家

義嘉 清河精選優良種子







金瓜子（木瓜型）
大號究尾菲菜子
美國大五寸人蔘子（胡蘿蔔）
美國球型洋蔥子
美國大心萵苣
美國加州大粒甜椒子
荊芥子（京芥子）
日本新理想菠薐（耐熱抗病力強早晚通用）
日本東湖菠薐菜子
日本長岡一號甘藍菜子
日本長岡福壽二號トマト
日本長岡福壽大型トマト
日本龍野川牛旁子
全年開花韭菜子
虎耳高荷菜子
苦瓜子（粗米）
千草子（涼粉子）
胭脂長茄子
特選想思樹子
蘋果型トマト
清江白菜子
益農素（促進發育健根健株增加收量）
日本四葉胡瓜子
富研西瓜子
一條根白菜子
大號應菜子（空心菜）
尖葉小號應菜子（空心菜）
紅仁白格二尺半長菜豆子
臺中種產紅仁白格目豆子
日本ニーメロン子
新型梨仔瓜子
北京劍葉結頭菜子
50天短種蘿蔔子（交春後可下種）
福特好242矮性皇帝豆子
日本タキイ黑葉系美濃大根蘿蔔（舊曆二月中旬下種）
新夏秋35天包心白菜子
白花芥蘭子
80天油菜子
水上產青皮竹竿黃麻子
565青皮竹竿黃麻子
紅皮黃麻子
棉葉古巴麻子

早春35天包心白菜子
梅花松蘿蔔子梅花春）
清河改良大梅花蘿蔔子
正晚生白葉白骨芹菜子
青皮白鼎胡瓜子（目瓜）
白花軟爽荷蘭豆子
臺中九號大爽荷蘭豆子
蘇魯矮性木瓜子
富岡西瓜子
海湖西瓜子