

你希望南瓜豐收嗎？

王進生

南瓜(金瓜)是最容易栽培的蔬菜，但因容易落果，很難得到良好的收成。南瓜也可作為養豬飼料，像今年受長期霜害，甘藷等飼料作物凍死，利用南瓜作為養豬飼料，是一種良好的辦法。那麼，怎樣來提高南瓜單位面積的產量呢？

提高南瓜單位面積產量的方法，計有下列幾點：

「雨水」之前播種

瓜類中，以南瓜最耐低溫，所以，篤農家都在十二月就開始播種，但因今年有一部分遭受霜害，必須重播，請剛快播種。因為南瓜的雌花，在短日和晝間夜間溫度差較大之下着生良好，「立春」以後日照慢慢變長，雌花着生就慢慢差了。

消毒種子保護「子葉」

種了宜用「賜保根」或「阿拉散」拌種消毒後下種。用「烏斯普龍」一千倍液消毒後洗淨下種亦可。

這樣可以在苗期預防炭疽病發生。

幼苗的子葉不可折斷或擦傷，因為子葉健全完整與否，將來的產量幾乎相差二至四成，必須注意。

直播時宜用五至八公分的切斷稻藁覆在子葉下面，預防下雨時葉背澆泥。

育苗時，宜在下雨之前用塑膠布

覆蓋，並在定植時千萬不可折斷子葉。每隔七天噴射「大生七八一四百」倍液一次，也是保護子葉方法之一。苗床不可太濕，以稍乾為宜。

選用日照好的土地

南瓜最需要日光，日光照射好時，南瓜才不易徒長，葉部粗剛且厚，節間最短，雌花着生也好。

「第一果」決定施肥量

南瓜的根群，都分佈在十二至十五公分深的地方，對「氮素」的吸收力很強，所以，種過南瓜的土地都變瘠薄。

在較肥的土地，或經常施用水肥的土地栽培時，容易發生莖葉徒長，或過於茂盛，那麼從第一果就開花落果。

所以，應視第一果的着果良好與否，來決定施肥的分量。

一般說來，幼果約長至飯碗大小時始不落果。

追肥宜用尿素和氯化鉀；兩者分量略相近。如果第一果着果情形良好，可施用兩者各六公斤(每十公畝)，繼續二次左右。

抑制植株生長勢力


注意以上幾點後，如果瓜株仍過於茂盛時，應間拔部分蔓，使日光

介紹正豐化學新貢獻農藥

成份正確保證効力

菇蟲滅乳劑

洋菇害虫防治上最適合之藥劑



美果素乳劑

防治蚜虫紅蜘蛛類
請用低毒性浸透移行殺蟲劑

靈丹乳劑

對近收穫期之果實、蔬菜類絕不留臭味及毒性均可安心使用

撲滅野鼠特效藥劑 莫思脫

收穫前之蔬菜類、瓜類、豆類、茶葉、果樹之害虫專治藥劑

可樂收乳劑



正豐化學股份有限公司

台中縣霧峰
TEL: 63