

洋菇 ◎ 木耳增收

請快用

土地公肥12號 洋菇荷爾蒙11號

茲為保證成分優秀防止偽品，
使價格低廉起見，限在……

農會配銷

茲因與農會特約關係，市面上恕不出售，
各地農會尚未到貨的地方，請寫信來連絡
本廠可介紹有貨的最靠近農會或托郵便購
買均可。

- | | | |
|----|-----------|------------|
| 定價 | ①土地公肥12號 | 100公分袋裝10元 |
| | | 600公分罐裝50元 |
| | ②洋菇荷爾蒙11號 | 100公分瓶裝30元 |

功 用

洋菇，木耳使用本品，可以耐寒耐熱耐乾
耐濕生長迅速，菌冠巨大，顏色純白，品
質堅實而美味，不粗根不龜裂不怕南風延
長菌床壽命約四十天（即可多收四十天的
產量，理論上一罐 600 公分裝，可以多收
一百臺斤的洋菇或木耳）如已經殘廢的菌
床或木料，噴射本品可以再生驚人的產量

使 用 法

每次噴水時一百臺斤水中，請加土地公肥
12號30瓦—40瓦（即1500—2000倍）或用
洋菇荷爾蒙11法6瓦（即10,000倍）向菌床
噴射即可，使用簡便無毒安全。

備有40公分裝樣品免郵供應二萬包，請用
明信片，註明詳細地址及姓名即可希速來
信，贈完為止。

蓬萊農藥工廠

（工廠登記證北府建二字1581號）
臺北縣新店鎮柴里石頭厝路1—1

透射良好。
間拔子蔓之後，如果繼續茂盛時，
宜用鋤頭或刀子切斷部分根部，減
低根部的吸肥能力。

切除「孫蔓」防止落果

南瓜的「孫蔓」是沒有用處的，
所以應儘量切除。孫蔓不但妨害日光
照射，而且容易發生蚜蟲，所以，應
及早切除。

切除孫蔓後，養分可以流至母蔓
或子蔓，減少養分之爭奪和落果。

人工授粉提高着果

天氣較冷，蜜蜂活動稀少時，宜
用人工授粉；時間以天剛亮時為宜。
但在露水多時，花粉容易固結成
粒，無法塗付柱頭，所以，應在前一

天傍晚，用膠布粘着雌花先端，使雌
花花瓣無法展開，防止露水侵入。
人工授粉後，繼續有二至三天晴
天始可着果。如果人工授粉後可能立
即下雨，宜在授粉後用迴形針或膠布
夾着雌花花瓣，防止雨水侵入妨害授
精。

每一「子蔓」只留一果

南瓜瓜果的發育，和葉數有關。
一般說來，一個瓜果發育，最少需要
十五至十六枚葉，所以每蔓着生二個
果實，必在果實發育間發生養分爭奪
，引起落果。

所以，每蔓只能留一果，先端的
雌花，應及早去除。

如能同時將先端無用的雌花，在
尚未充分發育之前切除，那就更好了。



你看到過——
這麼大的蘿蔔嗎？

這個特大號蘿蔔，和圖中的八歲女孩，長
得差不多大小。這是花蓮木瓜林區灌溉工作
主任彭仁漢種成的，重二十二斤半，長三尺三
寸，直徑寸半。（自由中國新聞資料供應社）