

麥門冬通常用分株繁殖，要點如下：
 ① 土質：以排水良好的砂質壤土為宜。
 ② 整地：春天深耕，務使土壤疏鬆，然後加入堆肥做基肥，每公頃一萬公斤，混合均勻，並把平土面，然後做高畦，畦寬一至一·五公尺，各畦間開小溝通路，溝寬為三十公分。
 ③ 分株：四至五月扦插種植，每公頃需種苗二千五百公斤，約有八萬株，行株距二十公分。
 ④ 灌溉：扦插種植後立即灌水。
 ⑤ 中耕除草：每二個月行中耕除草一次。
 ⑥ 施肥：整地時施基肥，堆肥每公頃一萬公斤。八月、十月、二月各施追肥一次，施豆餅、過磷酸鈣、硫酸鉀或草木灰。鉀肥肥效大，需多量施用，每公頃施草木灰約三千公斤。

採收加工

栽培後次年四、五月間採挖，掘起整株，剪下帶鬚根的塊根，洗淨泥砂，置日光下翻曬三至四天後，堆積在通風處，使反潮，蒸發水氣，約三日。如此反復二至三次，即可開始第一次修剪，鬚根兩端可保留約二公分長的鬚根。曝曬二至三次，至七八成乾時進行第二次修根，將鬚根徹底剪除。按商品大小分開，曬乾，再裝入麻袋內撞淨皮鬆，過篩

葡萄施肥的標準

臺灣的葡萄，應在二月中旬以前施肥，你可知道，每公頃應施多少肥料最為適當嗎？
 葡萄園的施肥方法，可分溝施和全園撒施兩種。所謂溝施法，又有環施法和放射溝施法兩種。
 葡萄園的施肥，應在修剪後立即施行，不能過遲，在臺灣，應在二月中旬以前施用完畢。

栽植五百株計
 算，標準施肥
 量如下表所示
 (公斤公頃)。並加施
 石灰七百五十公斤。

肥料種類	樹齡						
	二年	三年	四年	五年	六年	七年	八至十年
氮	〇·五	一·〇	一·五	二·〇	二·五	三·〇	三·五
磷	〇·五	一·〇	一·五	二·〇	二·五	三·〇	三·五
鉀	一·〇	二·〇	三·〇	四·〇	五·〇	六·〇	七·〇

，即為商品。每公頃採收量約一千至二千公斤。

性狀鑑別

麥門冬呈紡錘形，兩頭鈍尖，中部肥滿，有的略帶鬚根，微彎曲，長一至四公分，中部直徑四至六公毫，表面黃白色，半透明，有不規則的縱皺紋。未乾透時，質較柔軟；乾後質堅硬，折斷面黃白色，角質狀，橫斷面中央有細小的木質部，氣微香，味微甜，一般認為品質較佳。
 其他所產野生麥冬，表面粗糙皺，黃黑色，體型瘦小而細，纖維性強，質量較差。以表面色黃白，質細膩柔軟，肥大有光澤，內面黃白色，兩頭修淨，有香氣，味甘者為佳。(楊永裕)



冬門麥種試所試農在者作文本

最新驚人的植物ホルモン
 劑已出現!!

快豐收液劑

葉面撒布劑
 中央標準局註冊商標第一二七一八號
 AUXIN-H61

快豐收之特點

- ① 增加作物體之生長果實着花之速度並促進成熟期
- ② 防止花落果改良善品質增加產量提早收成
- ③ 增加促芽率促進活着力
- ④ 抵抗病蟲害並防止稻熱病等發生
- ⑤ 增加產量二成至六成
- ⑥ 快豐收品質絕對與他貨大不相同

製造廠神農化工廠有限公司出品
 廠址 南投縣名間鄉中正村彰南路三之一

各位農友您們要優良種子嗎？

在這裡為您們介紹使您們滿意收穫!!

- 春早0天包心白菜子
- 早生30天青粉菜包心白菜子
- 一代交配番茄子
- 日本福壽二號番茄子
- 日本赤福三號番茄子
- 日本大湖福壽番茄子
- 日本東湖福壽番茄子
- 純正楠型番茄子
- 優良蘋果型番茄子
- 小粒梨型番茄子
- 正晚生白背白菜葉菜子
- 其它種子在庫豐富備有目錄，函索即寄，國內種子如需樣本，請付八角郵票不過要註明什麼種子以便奉贈

金蓮種子行

本行：員林鎮光明街十一號(果菜市場前)
 分行：永靖鄉永興路六十一號(永靖農會邊)
 郵政劃撥儲金中字二〇八四五號