

長溝，以免竹根侵入柑園。②種植大莖枝或相思樹（防風力特強，且有根瘤菌，又可加以修剪。保持適當高度，並使枝葉茂盛）。每公尺一株，株間再配以觀賞竹，即可加強防風，並兼作籬笆。（林文鏡）

四季桔栽培法



莖斤左右。

三、四季桔對氣溫，土壤等之適應性雖強，但海拔五百公尺以下之排水良好，肥沃砂質壤土為栽培適地。

四、山地開墾完竣後，須有水土保持設置。種植時挖三×三×三英尺植穴，放入二十畧斤完熟堆肥後，與土壤混和，然後栽植。

五、施肥量（每株）

第一年 一五〇克 硫酸鉀 過磷酸石灰 硫酸鉀
 第三年 三五〇克 一五〇克 五〇克
 第五年 三〇〇克 三五〇克 一〇〇克
 六、中耕除草、客土、鋪草等工作，照一般柑桔。（翁仁祿）

鹼性水不宜灌溉果樹

蒸餾水則無影響



【問】：一、柑桔類以及各種果樹，是否可灌漑有鹼性之廢水（因該廢水裡包含洗衣服之肥皂水）？（番路鄉農會陳文彬）

【答】：一、柑桔類及其他果樹，均喜鹼性或中性土壤，偶然以肥皂水灌漑，無嚴重

障礙，但經常灌漑鹼性水則不適宜。

二、蒸餾水時，除冷卻用水需量較多外，真正蒸餾釜中蒸餾出之水極有限。油分取走後，其水用於灌漑果樹，效果應和普通之水無異，無特別之益處或壞處。（陸之琳）

桑樹用挿木法繁殖

【問】：一、桑樹應該用有性繁殖或無性繁殖？其繁殖法如何？

二、現在是不是繁殖時期？
 三、桑樹之管理如何？
 四、病蟲害如何防治？（雲林榮家習藝組）

【答】：一、桑苗繁殖的方法很多，有無性繁殖法，亦有有性繁殖法，本省通行無性繁殖的挿木法。

二、每年十二月及一、二月間氣溫較低，正是繁殖桑苗的適當時期。貴組如擬繁殖桑苗，最好函請臺北市羅斯福路四段一三巷一三號、臺灣省農林廳蠶業改良場，派員指導。

三、至於桑園管理及病蟲害防治，也可請蠶改場派員指導。（耿立利）

阿特靈與氫氮化鈣

可以同時施入土中



【問】：欲行土地消毒，先用「氫氮化鈣」施入土中犁翻，再噴用規定量的「阿特靈」入土中再犁翻。這樣「阿特靈」是否會失去藥效。

【答】：為防治土壤害蟲，「阿特靈」殺菌劑可與「氫氮化鈣」（鳥肥）同時施用於地上，並不影響「阿特靈」之殺菌效力（因阿特靈不怕鹽基性）。但因「氫氮化鈣」本身對作物有毒害，故翻耕拌土後，砂地須經二星期、粘土須經一星期、壤土須經十天左右，才可種植作物。（張良傳）

尿素

肥料效等於硫酸銨22倍
 尿素中性連續使用保證無害

——其他化學肥料——
 氯化鉀 過磷酸鈣 磷酸銨 化成氮磷
 成份保證 肥家最大
 台灣肥料股份有限公司
 台北市中街九十一號 電話：二五六一——

大肥

抗生素綜合維他命礦質補助飼料

飼料店，
農會均售

促進產卵
預防疾病

益源製葯所
 台北市羅斯福路三段二七二號